

*WILLIAM H. ANDERSON
and DONALD M. ANDERSON*

*Type Specimens
in the Hans Eggers
Collection of
Scolytid Beetles
(Coleoptera)*

SERIAL PUBLICATIONS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION

The emphasis upon publications as a means of diffusing knowledge was expressed by the first Secretary of the Smithsonian Institution. In his formal plan for the Institution, Joseph Henry articulated a program that included the following statement: "It is proposed to publish a series of reports, giving an account of the new discoveries in science, and of the changes made from year to year in all branches of knowledge." This keynote of basic research has been adhered to over the years in the issuance of thousands of titles in serial publications under the Smithsonian imprint, commencing with *Smithsonian Contributions to Knowledge* in 1848 and continuing with the following active series:

Smithsonian Annals of Flight
Smithsonian Contributions to Anthropology
Smithsonian Contributions to Astrophysics
Smithsonian Contributions to Botany
Smithsonian Contributions to the Earth Sciences
Smithsonian Contributions to Paleobiology
Smithsonian Contributions to Zoology
Smithsonian Studies in History and Technology

In these series, the Institution publishes original articles and monographs dealing with the research and collections of its several museums and offices and of professional colleagues at other institutions of learning. These papers report newly acquired facts, synoptic interpretations of data, or original theory in specialized fields. These publications are distributed by subscription to libraries, laboratories, and other interested institutions and specialists throughout the world. Individual copies may be obtained from the Smithsonian Institution Press as long as stocks are available.

S. DILLON RIPLEY
Secretary
Smithsonian Institution

SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO
ZOOLOGY

NUMBER 94

William H. Anderson
and Donald M. Anderson

Type Specimens
in the Hans Eggers
Collection of
Scolytid Beetles
(Coleoptera)

SMITHSONIAN INSTITUTION PRESS
CITY OF WASHINGTON
1971

ABSTRACT

Anderson, William H., and Donald M. Anderson. Type Specimens in the Hans Eggers Collection of Scolytid Beetles (Coleoptera). *Smithsonian Contributions to Zoology*, number 94, 38 pages, 1971.—A list of all holotype and lectotype specimens of the Eggers collection of Scolytidae, with a brief discussion of the acquisition of the collection by the National Museum of Natural History. References to original descriptions, type localities, deposition of type series, and type numbers are given for types listed under 394 specific or infraspecific names. Of the total specimens listed, 237 are designated as lectotypes.

Official publication date is handstamped in a limited number of initial copies and is recorded in the Institution's annual report, Smithsonian Year.

UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON : 1971

For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office
Washington, D.C. 20402 - Price 45 cents (paper cover)

*William H. Anderson
and Donald M. Anderson*

Type Specimens in the Hans Eggers Collection of Scolytid Beetles (Coleoptera)

Hans Eggers (1873–1947), a university-trained forester who rose to the post of “Forstrat,” or forest commissioner, was a student of bark beetles who lived and worked in several forest districts in Germany, eventually settling at Bad Nauheim. In becoming one of the world’s foremost authorities on the family Scolytidae, he described (according to Schedl, 1949) more than 1,100 species and assembled a large research collection of these beetles.

In the list set forth on the following pages, all the holotype and lectotype specimens presently in the Eggers collection of Scolytidae and now housed in the National Museum of Natural History of the Smithsonian Institution, are catalogued alphabetically under their specific or varietal names. Most of them are types of the many species described by him between the years 1908 and 1949, but a few represent species described by W. J. Eichhoff, J. M. Hagedorn, C. F. Schaufuss, and K. E. Schedl. Because Eggers and the other authors mentioned often

did not formally designate holotypes, 237 of the 394 type specimens listed have been selected from series of syntypes and designated as lectotypes. The specimens so designated are understood to be from Hans Eggers’ collection (including those he acquired from other workers and incorporated into it) unless otherwise specified.

The list does not include all the species described by Eggers because he deposited some of his type material in other collections and because some types are simply missing. The type specimens and the several thousand other specimens acquired from Eggers were placed together as a unit in the United States National Collection of Insects by the senior author.

Under each name in the list is given (1) a reference to the original description; (2) the type locality, or localities, quoted from the original description; (3) a quotation of the describer’s statement concerning the deposition of the type series; (4) the sex, if known, of the type specimen; and (5) its USNM (United States National Museum) number. The original, but not necessarily the present, generic placement of each species is indicated. Some original labels, such as identification or “Type” or “Cotype” labels, are not mentioned unless they are of value in validating the choice of a specimen as a type. All decisions made about the identity of types or selection of

William H. Anderson, Research Associate, Department of Entomology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560. Donald M. Anderson, Systematic Entomology Laboratory, U.S. Department of Agriculture, c/o National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560.

lectotypes were based upon a critical study of the original descriptions, the specimens, and their labels. Certain remarks pertinent to these decisions have been quoted from the descriptions. The type localities, often transliterated into German by Eggers, were compared with the label data and annotated if different or if additional information appeared on the labels. All types listed were labeled with their assigned type numbers and all lectotypes were labeled to indicate their status.

The idea of attempting to purchase the Eggers collection or a representative sample of it was conceived in 1945. Negotiations and correspondence with German nationals at that time was difficult and had to be done through American military personnel stationed in Germany. At the request of the senior author, Captain William J. Livingston very kindly went to Bad Nauheim, where, with the help of the Burgomeister, he located Eggers and reported him to be in good health, contentedly working with his collection and describing new species. Subsequently Eggers wrote that he was not ready to part with his collection because he needed it for his research. In December 1945, however, he wrote again to say that he had decided to part with his collection. He was then seventy-two years old. His correspondence with foreign museums and collectors had been stopped because of the war and he felt that he would not live long enough to resume the work that had thus been interrupted. He stated that he was willing to sell "the larger and more valuable part of my collection with about 1,800 species, 350 types, 1,000 cotypes, and numerous specimens compared with types, in all more than 6,000 specimens."

In spite of the continuing difficulties in communication, a value for the collection, mutually satisfactory to him and to the then Bureau of Entomology and Plant Quarantine of the United States Department of Agriculture was established, and in June 1946 the money was obligated. After a series of delays, a packing case containing insect boxes was received in Germany by the office of the military government of the United States for use by Eggers in shipping his collection.

At this time, Captain J. O. Nottingham, who had background knowledge in systematic entomology, worked with him in planning for the packing of the collection and was present in Germany when Eggers received the carton from the United States and began the transfer of specimens from his drawers to the insect boxes.

In a letter dated 24 February 1947 Eggers wrote that in spite of the cold weather he hoped to deliver the collection, all packed, to Captain Nottingham by the end of April 1947. Possibly because of the rigors of the winter, he did not complete the packing, and that summer a brief letter from Mrs. Elsa Eggers, dated 8 July 1947, was received advising us that Hans Eggers had died two days previously, on 6 July (see Schedl, 1949, for an obituary).

Through the continued interest of individuals in the office of the military government of the United States, a European entomologist was sought to complete the packing so that the collection could be delivered to us and Mrs. Eggers could receive the money for it. Some months later the services of Dr. Karl E. Schedl, then at Vienna, Austria, were secured, and in May 1948 he proceeded from Austria to Bad Nauheim to complete the preparation of the collection for shipment to the United States. As he packed the collection Dr. Schedl borrowed some specimens, material he needed in his own research, and after the main portion of the collection had been received in the United States, he sent forward additional shipments.

As received, the collection contained representatives of fewer species than expected; nonetheless, this assemblage of meticulously mounted and labeled specimens, with its types and its many authentically determined examples from so many parts of the world, constitutes a valuable reference for research on and identification of Scolytidae. Since, however, some elements of the Eggers collection, including type specimens, are still missing, it is hoped that any Eggers material discovered in other collections will be reported in the literature and/or returned to the Smithsonian's National Museum of Natural History for deposit with the collection to which it originally belonged.

***abbreviatus, Crypturgus numidicus* var.**

Eggers, 1911b: 123.

Type Locality.—“Mostar blato, (Herzegowinan).”

Type Series.—“... aus Mostar blato (Herzegowinan), vom Pentelikon (Attica), beide im Landesmuseum, und durch Schatzmayr gesammelt von der Insel Syra in coll. Leonhard.”

Lectotype.—One of the above, labeled “Most. bl,” USNM 60654.

acaciae, Cryphalus

Eggers, 1920: 120.

Type locality.—“Cheren, Abessinien.”

Type Series.—“Eine Reihe im Museo Civico, Genova und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60295.

adjunctus, Xyleborus

Eggers, 1924: 108.

Type Locality.—“Mont Kalombo, Manyema, Congostaat.”

Type Series.—“... dasselbe eine neue Art bildet.”

Holotype.—The above female, USNM 60758

adustum, Hylocurosoma

Eggers, 1943a: 368.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60331.

aethiopicus, Dryocoetes

Eggers, 1927e: 178.

Type Locality.—“Abessinien.”

Type Series.—“5 Stück in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60182.

affinis, Eccoptogaster

Eggers, 1914: 108.

Type Locality.—“Mazedonien.”

Type Series.—“... fiel mir ein Käfer aus der Weise’schen Sammlung auf, den mir Herr Georg Reineck—Berlin freundlichst überliess. Er stammt nach der Fundorsangabe aus Mazedonien”

Holotype.—The above, a male, USNM 60409.

africanus, Dactylipalpus

Eggers, 1919[1920]: 229.

Type Locality.—“Ostafrika.”

Type Series.—No comment concerning the number of specimens.

Lectotype.—The specimen from the Schaufuss Collection, bearing Schaufuss’ and Eggers’ Type label, a male, labeled “Ukami, D.O. Afrika” USNM 60983.

agnatus, Chortastus

Eggers, 1935b: 301.

Type Locality.—“Kamerun.”

Type Series.—“2 ♂, 1 ♀ in meiner Sammlung.”

Lectotype.—One of the above males, USNM 59250.

agnatus, Stephanoderes

Eggers, 1924: 103.

Type Locality.—“Elisabethville, (Congo).”

Type Series.—“3 Stücke im Congo-Museum, Tervueren und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above males, USNM 60140.

alluaudi, Xyleborus

Schaufuss C., 1897b: 210.

Type Locality.—“Madagascar; Diego Suarez.”

Type Series.—“Weibchen in Menge, nur ein einziges Männchen.”

Lectotype.—One of the above, bearing Schaufuss’ identification label and Eggers’ Type label, a female, USNM 60718.

alter, Xyleborus

Eggers, 1931a: 22.

Type Locality.—“Brasil.”

Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, a female, USNM 60669.

alternatus, Thamnurgides

Eggers, 1927b: 398.

Type Locality.—“Sumatra.”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, which bears the additional locality record “Fort de Kock.” USNM 60193.

amazonicus, Loganius

Eggers, 1929a: 60.

Type Locality.—“Brazilia (Santarem, Amazonas).”
 Type Series.—“Eine Reihe in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60390.

amazonicus, Stephanoderes

Eggers, 1934b: 78.
 Type Locality.—“Brasil (Amazonas: Manaus).”
 Type Series.—“Typen und Cotypen in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60142.

amurensis, Eccoptogaster (Scolytus)

Eggers, 1908a: 144.
 Type Locality.—“Sibiria orientalis (Amur sup.).”
 Type Series.—“1 ♂, 1 ♀ legit. C. Rost; nunc in coll. Eggers.”
 Lectotype.—The above male, USNM 60410 (The specimen has been dissected by Klimesch).

anatolicus, Eccoptogaster

Eggers, 1911a: 74.
 Type Locality.—“Burna, Asiae Minoris.”
 Type Series.—“2 specimina in coll. mea”
 Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60413.

andresi, Phloeosinus

Eggers, 1927c: 120.
 Type Locality.—“Stambul.”
 Type Series.—“3 ♂ in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a female, (not a male as stated by Eggers), USNM 59255.

angustior, Camptocerus

Eggers, 1928b: 91.
 Type Locality.—“Bolivia (Yungas, 1.000 m.).”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und Sammlung Hagedorn des Hamburger Zool. Museums.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, a male, USNM 60630.

angustior, Cryphalus

Eggers, 1927b: 395.
 Type Locality.—“Süd Sumatra.”
 Type Series.—“1 type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, also labeled “Wai Lima,” USNM 60296.

angustior, Xyelborus (sic)

Eggers, 1925: 158.
 Type Locality.—“Birma (Tenasserim).”
 Type Series.—“1 Type aus coll. Schaufuss in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60860.

apfelbecki, Crypturgus

Eggers, 1940c: 36.
 Type Locality.—“Bosnien (Borke bei Sarajevo).”
 Type Series.—“Typen in meiner Sammlung. Cotypen in mus. Sarajevo und in Sammlung Schimitschek.”
 Lectotype.—One of the above Types, a male, 60649.

argentinensis, Pityophthorus

Eggers, 1949–50 [1951]: 150.
 Type Locality.—“Argentinien (Salta).”
 Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers.”
 Lectotype.—The upper of 4 specimens on the same pin, each on a separate card, the pin bearing Eggers' Type label, USNM 69627.

argentinensis, Prionosceles

Eggers, 1928b: 87.
 Type Locality.—“Argentinien.”
 Type Series.—“2 Typen von Argentinien, in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, USNM 60356.

argentinensis, Scolytopsis

Eggers, 1937: 84.
 Type Locality.—“Argentinien (Prov. Tucumán).”
 Type Series.—“Typen (Männchen und Weibchen) in meiner Sammlung”
 Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60627.

artepunctatus, Dryocoetes

Eggers, 1941b: 122.
 Type Locality.—“Weissrussland (Bialojesh).”
 Type Series.—“... leg. I. I. Karpinski 6·5·1934. Ein zweites Stück fand der Sammler 20·9·1931.”
 Lectotype.—The specimen collected 6·5·1934, USNM 60184.

ater, Dendrosinus

Eggers, 1930b: 167.

Type Locality.—“Östbolivia.”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers; Cotype, Brazil ... im Zool. Museum Berlin”

Holotype.—The above Type, a male USNM 60227.

ater, Negritus

Eggers, 1923b: 142.

Type Locality.—“P. Princesa (Insel Palawan).”

Type Series.—“Mt. Makeling (Insel Luzon); P. Princesa (Insel Palawan); Butuan (Insel Mindanao) auf der Philippinen, 3 Stück im Museum Dresden und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, from P. Princesa, USNM 53872.

ater, Ozopemon

Eggers, 1933c: 101.

Type Locality.—“Mukue Tatsienlu, Czechuan, China.”

Type Series.—“Type und Cotypen in der Sammlung Eggers, Cotypen und Serie besitzt Emm. Reitter.”

Holotype.—The above Type, USNM 60619.

ater, Prionosceles

Eggers, 1943a: 365.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60357.

attenuatus, Stephanoderes

Eggers, 1935b: 306.

Type Locality.—“Congostaat (Stanleyville)”

Type Series.—“Type in coll. Eggers. 2-Exemplare aus Sierra Leone (...) in coll. Imp. Institute of Entomology, Brit. Museum.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60144.

***auratus, Xyleborus squamulosus* var.**

Eggers, 1923b: 193.

Type Locality.—“Bandar Baroe, an der Ostküst Sumatras.”

Type Series.—“2 Stücke von J. B. Corporaal in

Bandar Baroe an der Ostküste Sumatras gefunden, in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, USNM 60757.

baicalicus, Pityogenes

Eggers, 1933e: 49.

Type Locality.—“Baicalgebiet.”

Type Series.—“2 ♂, 2 ♀ in meiner Sammlung, von Prof. Stark in Leningrad übersandt, ebensoviel Cotypen in Sammlung Stark.”

Lectotype.—One of the above Eggers male specimens, USNM 60286.

bangensis, Cryphalomorphus

Eggers, 1927a: 75.

Type Locality.—“Philippinen, Mindanao, Provinz Zamboanga, Port Banga.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, USNM 60874.

bangensis, Sphaerotrypes

Eggers, 1927a: 73.

Type Locality.—“Philippinen, Mindanao, Provinz Zamboanga, Port Banga.”

Type Series.—“... eine Reihe in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a male, USNM 29124.

bañosus, Hoplites

Eggers, 1923b: 141.

Type Locality.—“Los Baños, (Luzon).”

Type Series.—“2 Stück im Museum Dresden und Sammlung Eggers. Einige Stücke erhielt ich noch von demselben Fundort durch C. F. Baker.”

Lectotype.—One of the Eggers specimens, USNM 60240.

batoensis, Diamerus

Eggers, 1927b: 392.

Type Locality.—“Batoe Inseln (Tanah Masa).”

Type Series.—“Batoe Inseln (Tanah Masa), Sammler Kannegieter, je 1 Type im Museum “Natura artis magistra” Amsterdam und Sammlung Eggers. 1 Stück von Kolambugan (Inseln Mindanao, Philippinen), Sammler C. F. Baker, in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a female, from Tanah Masa, Batoe Island, USNM 59075

beesoni, Crypturgus

Eggers, 1936a: 627.
 Type Locality.—“Kaschmir.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung des indischen Forstinstituts (Forest Research Institute and College) in Dehra Dun und in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Types, a male, USNM 60650.

bicallosus, Scolytus

Eggers, 1933b: 75.
 Type Locality.—“Ungarn (Sagvar).”
 Type Series.—“1 Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, a male, USNM 60404.

bicaudatus, Ips

Eggers, 1927a: 80.
 Type Locality.—“Philippinen: Basilan.”
 Type Series.—“... eine Reihe in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, a male, USNM 29111.

bicolor, Cnesinus

Eggers, 1943a: 376.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers. Cotype auch im Museum Paris.”
 Holotype.—The above Type, a female, USNM 60316.

bicolor, Hypothenemus

Eggers, 1919: 241.
 Type Locality.—“Amani (Ostafrika).”
 Type Series.—“8 Stück in Sammlung Hagedorn und Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60171.

bicolor, Problechilus

Eggers, 1932d: 228.
 Type Locality.—“Nicaragua.”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60231.

bicolor, Sphaerotrypes

Eggers, 1927a: 70.
 Type Locality.—“Borneo, Sandakan.”

Type Series.—“1 Weib, Type, in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 59232.

biconicus, Xyleborus

Eggers, 1928b: 97.
 Type Locality.—“Brasil.”
 Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60771.

bimaculatus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 88.
 Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Iligan.”
 Type Series.—“1 Stück, in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60695.

biseriatus, Stephanoderes

Eggers, 1919 [1920]: 240.
 Type Locality.—“Kilossa, Deutsch-Ostafrika.”
 Type Series.—“5 Stücke in Sammlung Hagedorn und Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60147.

bispinosus, Ips

Eggers, 1927a: 78.
 Type Locality.—“Philippinen: Mindoro, Mangarin.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, a male, USNM 29110.

bodei, Phloeoborus

Eggers, 1930b: 164.
 Type Locality.—“Bolivia.”
 Type series.—“4 ♂ aus Bolivia, ohne näheren Fundort, und 1 ♂, 1 ♀ Bolivia. Dept. S. Cruz, Umgegend Buenavista, 450 m. hoch, Sammler Steinbach, in Sammlung Eggers. Eine Grössere Reihe”
 Lectotype.—One of the above, without further locality, USNM 59067.

boettcheri, Sphaerotrypes

Eggers, 1927a: 72.
 Type Locality.—“Philippinen: Mindoro, Subaan.”

Type Series.—“1 Weib, Type, in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, a female, USNM 59233.

bolivianum, Monarthrum

Eggers, 1935c: 80.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type ♀ und ♂ und Cotypen in meiner Sammlung. Cotypen auch im Museum von Paris, vom Gleichen Fundort.”

Holotype.—The female, mentioned specifically as Type by Eggers (1935c: 81), USNM 60369.

bolivianus, Corthylus

Eggers, 1943a: 379.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, a female, USNM 60379.

bolivianus, Cryptocarenum

Eggers, 1943a: 356.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers, Cotype (leg. Germain), im Museum Paris.”

Holotype.—The above Type, USNM 60245.

bolivianus, Phloeotribus

Eggers, 1933a: 5.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, a male, USNM 60862.

bolivianus, Prionosceles

Eggers, 1928b: 88.

Type Locality.—“Ostbolivien.”

Type Series.—“2 Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, bearing the locality “Cochabamba, Bolivia,” USNM 60358.

bolivianus, Scolytodes

Eggers, 1928b: 86.

Type Locality.—“Ostbolivien.”

Type Series.—“... 3 Stück; ... in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, which bears the locality: Cochabamba. Bolivia, USNM 60397.

bolivianus, Stephanoderes

Eggers, 1931b: 29.

Type Locality.—“Ostbolivien.”

Type Series.—“Type und zwei Cotypen in Sammlung Eggers, ebenso 1 Cotype aus Brasilien 1 Cotype aus Sao Paulo, Sammler Mráz, in Museum Prag.”

Holotype.—The above Type, which bears the locality “Cochabamba, Bolivia,” a female, USNM 60148.

bolivianus, Xyleborus

Eggers, 1943a: 385.

Type Locality.—“Bolivia.”

Type Series.—“Type und Cotype in coll. Eggers.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60769.

brasiliensis, Prionosceles

Eggers, 1928b: 89.

Type Locality.—“Blumenau in Sudbrasilien.”

Type Series.—“1 Stück aus Blumenau in Südbrasilien in Sammlung Eggers.”

Holotype. The above, USNM 60359.

brasiliensis, Scolytopsis

Eggers, 1931a: 16.

Type Locality.—“Brazil (Sta. Catharina, Lages).”

Type Series.—“♂ Type (von Hagedorn als *puncticollis* bestimmt) in meiner Sammlung; mehrere ♂ und ♀ (Cotypen) fand ich im Zool. Museum Berlin von gleichen Fundort und Sammler.”

Holotype.—The above Type, USNM 60628.

brasiliensis, Xyleborus

Eggers, 1928b: 96.

Type Locality.—“Brazil, Blumenau (Sta. Cath.).”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und im Instituto Biologico, S. Paulo.”

Lectotype.—The Eggers, Type, a female, USNM 60712.

brevior, Hypocryphalus

Schedl, 1943: 40.

Type Locality.—“St. Theodoro, Ins. Mindoro, Philippinen.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und Schedl.”

Lectotype.—One of the Eggers Types, a female, USNM 60175.

brevior, Pelicerus

Eggers, 1927a: 86.

Type Locality.—“Philippinen, Masbate, Aroroy.”

Type Series.—“Typen: Philippinen, Masbate, Aroroy. Luzon, Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan; Sammler Böttcher; in Sammlung Eggers. An letzterem Fundort sammelte ihn auch Banks. Cotypen in Sammlung Bureau of Science, Manila.”

Lectotype.—One of the above Types, the upper of two on the same pin, a male, data label bearing date “2/9·/18,” USNM 53885.

brevior, Poecilips

Eggers, 1927a: 84.

Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Mountain, Balbalan”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, USNM 60206.

brevis, Bothrosternus

Eggers, 1933a: 15.

Type Locality.—“Brazil (São Paulo).”

Type Series.—“Fundort der Type; Brasil (São Paulo), Cotypen Blumenau (Brasil) und Bolivia (Cochabamba) in coll. Eggers, 1 Cotype Venezuela (Puerto Caballo) im Pariser Museum.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60313.

brevis, Ozopemon

Eggers, 1923b: 155.

Type Locality.—“Sipora auf der Insel Mentawai.”

Type Series.—“... 2 Stück im Museum Genova und Sammlung Eggers. Ein weiteres Stück meiner Sammlung aus Niederländisch Indien trägt die Bemerkung “in Ficus”.”

Lectotype.—One of the above, USNM 60620.

brevis, Problechilus

Eggers, 1932d: 231.

Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”

Type Series.—“Type und Cotype in coll. Eggers.”

Holotype.—The above Type, USNM 60232.

bucco, Xyleborus

Schaufuss II, 1897b: 212.

Type Locality.—“Sechellen; La Digue.”

Type Series.—“In grösserer Anzahl erbeutet” (no comment on the distribution of the type material).

Lectotype.—A specimen from the Schaufuss collection bearing Schaufuss’ and Eggers’ Type labels, a female, USNM 60774.

camerunus, Ozophagus

Eggers, 1919: 235.

Type Locality.—“Kamerun.”

Type Series.—“3 Stück, 1 ♂, 2 ♀ in Sammlung Schreiner und Eggers. Ein weiteres Stück daher steckt im Berliner Zool. Museum.”

Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60139.

camerunus, Pseudocrypturgus

Eggers, 1919: 236.

Type Locality.—“Kamerun.”

Type Series.—“1 Stück aus Kamerun (Conradt) in Sammlung Schreiner. Eine weitere Reihe sah ich im Genueser Museum von der Insel Annobon.”

Holotype.—The above, USNM 60647.

canaliculatus, Xyleboricus

Eggers, 1923b: 216.

Type Locality.—“Neu Guinea und Neupommern.”

Type Series.—“Typen in Museum Civico Genova, Zool. Museum Berlin und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, labeled. “N. Guinea S.E., Paumotu riv.,” USNM 60685.

canariensis, Coccotrypes

Eggers, 1928a: 117.

Type Locality.—“Gran Canaria (Las Palmas) im Park Santa Catalina”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers, Cotypen in Sammlung Uytenboogaart.”

Lectotype.—One of the above Types, a female, USNM 60608.

capito, Xyleborus

Schaufuss II, 1897b:215.

Type Locality.—“Philippinen.”

Type Series.—“Aus Eichoffs Sammlung” (no comment on the number or distribution of the type material).

Lectotype.—A specimen from the Schaufuss collection bearing Schaufuss’ and Eggers’ Type labels, a female, USNM 60767.

capucinoides, Xyleborus

Eggers, 1941a: 104.

Type Locality.—“Guadeloupe (Gourbeyre).”

Type Series.—“Type u. Cotypen in coll. Eggers. Cotypen auch in coll. Fleutiaux”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60761.

caraibicus, Cryptocarenus

Eggers, 1937: 82.

Type Locality.—“Guadeloupe.”

Type Series.—“Type und 1 Cotype von Guadeloupe (leg. Dufau); 1 Cotype von Venezuela. Alle in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above Type, USNM 60246.

caraibicus, Xyleborus

Eggers, 1941a: 103.

Type Locality.—“Guadeloupe.”

Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers; Cotypen im Museum Paris und im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60681.

carinatus, Spaeotrypes

Eggers, 1927a: 71.

Type Locality.—“Borneo, Sandakan.”

Type Series.—“1 Weib, Type, in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 59236.

carpini, Sphaerotrypes

Eggers, 1926: 134.

Type Locality.—“Sapporo.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, USNM 59237.

caudatus, Scolytus

Eggers, 1931b: 35.

Type Locality.—“Rio de Janeiro.”

Type Series.—“Vier Käfer in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60405.

collaris, Xyleborus

Eggers, 1923b: 194.

Type Locality.—“Batoe Inseln (Tanah Masa).”

Type Series.—“... von Kannegieter Gesammelt, je 1 Type in Sammlung “Natura Artis Magistra” in Amsterdam und in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—The Eggers Type, USNM 60754.

collarti, Xyleborus

Eggers, 1932b: 300.

Type Locality.—“Congostaat (Foret de Kawa).”

Type Series.—“Type und Cotypen in Sammlung Eggers, Cotypen in Sammlung Collart.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60762.

comatum, Eupteroxylon

Eggers, 1936c: 393.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type Weibchen, in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above, USNM 60892.

communis, Cryphalomorphus

Schaufluss II, 1891: 12.

Type Locality.—“Madagascar.” [from label]

Type Series.—“Sehr gemein” (no remarks on disposition of types).

Lectotype.—A specimen from the Schaufuss collection bearing Schaufuss’ and Eggers’ Type labels, USNM 60875.

confinis, Webbia

Eggers, 1927a: 106.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan.”

Type Series.—“... der Einzeltype ... in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above, USNM 60597.

confusum, Hylocurosoma

Eggers, 1943a: 370.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60332.

confusus, Eccoptogaster

Eggers, 1922a: 13.
 Type Locality.—“Wladiwostok.”
 Type Series.—“3 ♀ in meiner Sammlung.”
 Lectotype.—One of the above, USNM 60414.

convexicauda, Xyleborus

Eggers, 1932b: 303.
 Type Locality.—“Westafrika (Goldküste).”
 Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60725.

cornutus, Xyleborus

Schaufuss II, 1891: 17.
 Type Locality.—“Madagaskar” (from label).
 Type Series.—“Sehr gemein “(no comment on the distribution of the type material).”
 Lectotype.—A female from the Schaufuss collection bearing Schaufuss’ and Eggers’ Type labels, USNM 60710.

corporaali, Xyleborus

Eggers, 1923b: 210.
 Type Locality.—“Kotangan, an der Ostküste, Sumatras.”
 Type Series.—“2 Stück in Sammlung Corporaali und Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60729.

corsicus, Crypturgus

Eggers, 1923a: 135.
 Type Locality.—“Corsica.”
 Type Series.—“... 5 Stücke in Sammlung Eggers, 2 davon im Forêt Carozzica von Bickhardt gesammelt.”
 Lectotype.—One of the above, a female, labeled “Asco, Forêt Carozzica,” USNM 60651.

costa-limai, Dendrocranulus

Schedl, 1938: 169.
 Type Locality.—“Santos, S. P.” [Brasil].

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und meiner eigenen.”
 Lectotype.—One of the above, USNM 60351.

costatus, Brachyspartus

Eggers, 1937: 85.
 Type Locality.—“Brasilien (Bahia).”
 Type Series.—“Typen (Männchen, Weibchen) im Britischen Museum, Cotype Männchen in meiner Sammlung”
 Lectotype.—One of the above cotypes, a male, USNM 60589.

crenatus, Xyleborus

Eggers, 1920: 42.
 Type Locality.—“Kangu.”
 Type Series.—“Kangu (Juli 1911) Sammlung Hagedorn 2 St.; Kamerun 2 St., im Deutsch. Ent. Museum Dahlem, 1 in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above from Kangu, a female, USNM 60678.

***cribripennis, Corriacephylus* [sic!]**

Schedl, 1943: 40.
 Type Locality.—“Kalambangan, Mindanao, Philippinen.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Schedl und Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, USNM 60179.

cubanus, Thamnurgides

Eggers, 1934b: 79.
 Type Locality.—“Cuba (Sierra Rosario; Cuyajabas).”
 Type Series.—“Type und 4 Cotypen in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60195.

cuneolus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 92.
 Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Laguna, Mt. Maquiling.”
 Type Series.—“1 Stück in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60823.

curtus, Thamnurgides

Eggers, 1927a: 80.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Agusan River.”

Type Series.—“je 2 Typen im Bureau of Science, Manila, und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, USNM 60197.

curtus, Xyleborus

Eggers, 1928b: 94.

Type Locality.—“Ecuador (Cachabé); Peru (Chanchamajo); Cayenne.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a female labeled “Cachabé, Ecuador,” USNM 60694.

cylindricus, Ozopemon

Eggers, 1923b: 156.

Type Locality.—“Sumatra.”

Type Series.—“Sumatra (Museum Lieden, Genova) und Perak (1 Stück) im Dresdener Museum. Typen in diesen 3 Museen und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, from Sumatra, USNM 60621. The specimen bears the additional locality, Saban Ajam.

cylindricus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 94.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Momungan. Luzon, Provinz Mountain, Balbalan.”

Type Series.—“... mehrere Stücke in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, from Balbalan, a female, the lower of two on one pin, USNM 53876.

cylindromorphus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 96.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Surigao, Surigao.”

Type Series.—“Mann und Weib in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—The above female, USNM 60752.

danicus, Crypturgus

Eggers, 1932c: 80.

Type Locality.—“Danemark, Insel Seeland (Geels Skov, c. 15 km nördlich Kopenhagen).”

Type Series.—“5 Stück, von Aug. West ... gesammelt. ♂ Type in coll. Eggers. ♀ Type u. Cotypen in coll. West.”

Lectotype.—The above male Type, USNM 60653.

dentatum, Monarthrum

Eggers, 1935c: 84.

Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”

Type Series.—“Type und Cotype in meiner Sammlung; 1 Cotype im Museum Paris.”

Holotype.—The above Type, a male, USNM 60370.

deplanatus, Chramesus

Eggers, 1940b: 124.

Type Locality.—“Guadeloupe (Gourbeyre).”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers, 1 Cotype im Museum Paris.”

Holotype.—Lost in the shipment of the Eggers collection; its pin and labels remain.

Lectotype.—The “Cotype” in the Paris Museum.

depressus, Thamnurgides

Eggers, 1927a: 82.

Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Laguna, Mont Maquiling.”

Type Series.—“1 Type in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above, USNM 60196.

desectus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 167.

Type Locality.—“Los Baños, (Luzon).”

Type Series.—“7 ♀, 1 ♂ im Dresdener Museum, und 4 ♀, 1 ♂ in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60687.

diadematus, Cryptocarenum

Eggers, 1937: 80.

Type Locality.—“Brasilien (Corumbá, Matto Grosso).”

Type Series.—“Type von Brasilien (Corumbá, Matto Grosso); Cotype von Venezuela (ex coll. Eichhoff); in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above Type, USNM 60247.

difficilis, Xyleborus

Eggers, 1923b: 174.

Type Locality.—“Java.”

Type Series.—“Einige Stücke in Sammlung Hagedorn und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60713.

dimidiatus, Xyleborus

Eggers, 1927b: 404.

Type Locality.—“Perak.”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, a female, USNM 60721.

discretus, Xyleborus

Eggers, 1933a: 29.

Type Locality.—“Peru (Marcapata).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers; Franz. Guayana, 1 Cotype in coll. Beeson.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60670.

dubius, Dryocoetes

Eggers, 1924: 105.

Type Locality.—“Congostaat, Kunungu.”

Type Series.—“Congostaat, Kunungu 5 Stück, Mongende 1 Stück; Sammler Dr Schouteden, im Congo-Museum Tervueren und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, from Kunungu, Congostaat, USNM 60187.

***duplicatus, Xyleborus squamulosus* var.**

Eggers, 1923b: 193.

Type locality.—“Perak.”

Type series.—“4 Stück in meiner Sammlung.”

Lectotype.—One of the above, USNM 60756.

eggersi, Cryptoxyleborus

Schedl, 1936: 60.

Type locality.—“Mindanao, Kolambugan.”

Type series.—“Types in the collections of Eggers and Schedl.”

Lectotype.—One of the Eggers Types, a female, USNM 60605.

eggersii, Coccotrypes

Hagedorn, 1904: 449.

Type locality.—“Ecuador.”

Type Series.—No remarks regarding disposition of types.

Lectotype.—A specimen from the Eggers collection bearing Hagedorn's identification label and Eggers' Type label, a male, USNM 60609.

eichhoffi, Xyleborus

Schaufuss II, 1891: (not Schreiner, 1882).

Type Locality.—“Madagascar” (from label).

Type Series.—(No comment on the distribution of the type material.)

Lectotype.—A female from the Schaufuss collection bearing Schaufuss' and Eggers' Type labels, USNM 60715.

elegans, Pityophthorus

Schedl, 1938: 184.

Type Locality.—“Guatemala.”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60251.

elongatum, Hylocurosoma

Eggers, 1943: 369.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Typen und Cotypen in coll. Eggers; Cotypen im Museum Paris.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, USNM 60333.

elongatus, Pelicerus

Eggers, 1927a: 85.

Type Locality.—“Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan.”

Type Series.—“Typen: Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan, 1 Mann, Sammler Böttcher. Negros, Provinz Occidental Negros, Fabrica, Sammler Schultze; in Sammlung Eggers; 1 Cotype von letzterem Fundort in Sammlung Bureau of Science, Manila.”

Lectotype.—The above male collected by Böttcher, USNM 60656.

emarginatus, Corthylus

Eggers, 1943a: 380.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type ♂ und ♀ in coll. Eggers.”

Lectotype.—The above male, USNM 60381.

emarginatus, Xyloctonus

Eggers, 1939b: 16.

Type Locality. — "Brit. Ostafrika (W. Nile ...)."
 Type Series. — "... Type und Cotype in meiner Sammlung, andere im Brit. Museum. 1 Cotype ... im Congo Museum, Tervuren."
 Holotype. — The above Type, USNM 60344.

excavatus, Anchonocerus

Eggers, 1935e: 330.
 Type Locality. — "Bolivien (Cochabamba)."
 Type Series. — "Holotype in meiner Sammlung."
 Holotype. — The above, a male, USNM 60375.

exsculptus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 101.
 Type Locality. — "Philippinen ... Mindanao ... Provinz Surigao, Surigao."
 Type Series. — "Typen in Sammlung Eggers."
 Lectotype. — One of the above, a female, USNM 60760.

fallax, Ips

Eggers, 1915: 96.
 Type Locality. — "Gouvernement Irkutsk."
 Type Series. — "4 Stücke, anscheinend 2 ♂♂, 2 ♀♀ aus Gouvernement Irkutsk, in meiner Sammlung."
 Lectotype. — One of the above, a male, USNM 60264.

fallax, Poecilips

Eggers, 1927b: 399.
 Type Locality. — "Java."
 Type Series. — "2 Typen in Sammlung F. C. Drescher (Baarn, Niederlande) und Eggers, Sammler Kalshoven."
 Lectotype. — One of the above Eggers Types, USNM 60210.

fennicus, Pityophthorus

Eggers, 1914: 183.
 Type Locality. — "Finnland: Karislojo, Turtola ..."
 Type Series. — "Typen in Sammlungen Sahlberg, Saalas, Eggers und im Finnischen Museum in Helsingfors."
 Lectotype. — One of the above, a male, USNM 60252.

formosanus, Scolytus

Eggers, 1939a: 115.

Type Locality. — "Formosa."
 Type Series. — No comments on type material or distribution.
 Lectotype. — A female from the Schaufuss collection bearing Schaufuss' and Eggers' Type labels, USNM 60716.

fornicator, Xyleborus

Eggers, 1923b: p. 184.
 Type Locality. — "Ceylon (Peradeniya)."
 Type Series. — "Typen in Sammlung Hagedorn und Eggers. 2 weitere Stücke aus Neu Guinea (Ighibirei ... im Museo Civico Genova)."
 Lectotype. — One of the above Eggers Types, a female, USNM 60740.

foveolatus, Pityogenes

Eggers, 1926: 137.
 Type Locality. — "Ontake (Prov. Shinano, Mittel-japan)."
 Type Series. — No remarks concerning disposition of types.
 Lectotype. — A female, bearing the above locality data and Eggers' Type label, USNM 60287.

fraterculus, Xyleborus

Schaufuss II, 1905: 19.
 Type Locality. — "Madagaskar."
 Type Series. — No comments on type material or distribution.
 Lectotype. — A female, from the Schaufuss collection bearing Schaufuss' and Eggers' Type labels, USNM 60716.

glaber, Loganius

Eggers, 1929a: 64.
 Type Locality. — "Ostbolivia" [the specimen bears the label Cochabamba, Bolivia].
 Type Series. — "Type in Sammlung Eggers."
 Holotype. — The above, USNM 60391.

gracilis, Amphicranus

Eggers, 1943a: 383.
 Type Locality. — "Bolivia (Cochabamba)."
 Type Series. — "Type in coll. Eggers."
 Holotype. — The above, USNM 60389.

gracilis, Tricolus

Eggers, 1937: 87
 Type Locality. — — "Guadeloupe."

Type Series.—“Type in meiner Sammlung; Cotypen in Sammlung Fleutiaux.”

Holotype.—The above Type, USNM 60591.

gracilis, Xyleborus

Eichhoff, 1868: 145.

Type Locality.—“Brasilia.”

Type Series.—No comment on specimens or distribution of types.

Lectotype.—A female bearing a small green label with the hand written word “Type,” and Eggers’ printed Type label, USNM 53840.

granulatus, Diamerus

Eggers, 1923b: 131.

Type Locality.—“Sumatra.”

Type Series.—“1 Type in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above, a female, USNM 59076.

granulifer, Strombophorus

Eggers, 1932a: 23.

Type Locality.—“Congostaat (Mayumbe: Pulu Banzi).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers, Cotype in coll. Collart.”

Holotype.—The above Type, USNM 59108.

granulifer, Xyleborus

Eggers, 1923b: 206.

Type Locality.—“Sinabang auf Simalur, einer Nebeninsel Sumatras.”

Type Series.—“... einige Stücke im Museum Leiden und Sammlung Eggers. Auch von Sumatra und Mentawai im Museo Civico Genova.”

Lectotype.—One of the above specimens from Sinabang, a female, USNM 53877.

granulipennis, Xyleborus

Eggers, 1930a: 194.

Type Locality.—“Nadghani (1,500’), Nilambur, Madras.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und Forest Research Institute.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60747.

grossepunctatus, Ozopemon

Eggers, 1923b: 155.

Type Locality.—“Kina Balu, Borneo.”

Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60623.

haberkorni, Xyleborus

Eggers, 1920: 43.

Type Locality.—“Amani, Deutsch-Ostafrika.”

Type Series.—“... eine Anzahl Stücke in Sammlung Hagedorn.”

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60702.

hagedorni, Coccotrypes

Eggers, 1908d: 216.

Type Locality.—“hab. Java, in fungis.”

Type Series.—“Specimina sex in coll. Fiori, Eggers, Hagedorn.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60299.

hercegovinensis, Phloeosinus

Eggers, 1922b: 120.

Type Locality.—“Herzegowina, ohne nahe Ortsbezeichnung.”

Type Series.—“Der Käfer, von dem ich ... 8 Stücke erhalten”

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 59256.

hispidus, Cnesinus

Eggers, 1943a: 378.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers, Cotype im Museum Paris.”

Holotype.—The above Type, USNM 60317.

hybridus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 90.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Momungan. Mindoro, Sabaan. Luzon, Mount Banahao.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a female from Momungan, USNM 60741.

hystrix, Adiaeretus

Eggers, 1919 [1920]: 242.

Type Locality.—“Amani (Deutsch-Ostafrika).”

Type Series.—“2 Stück in Sammlung Hagedorn und Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60663.

imitans, Dactylipalpus

Eggers, 1922c: 164.
Type Locality.—“Ebolowa, in Kamerun.”
Type Series.—“... ein ♀, ... , in meiner Besitz.”
Holotype.—The above, USNM 59064.

imitans, Microborus

Eggers, 1940b: 131.
Type Locality.—“Insel Guadeloupe.”
Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
Holotype.—The above, USNM 60364.

imitans, Phloeosinus

Eggers, 1927a: 75.
Type locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan.”
Type Series.—“... je 1 Type in Sammlung Bureau of Science, Manila, und Sammlung Eggers.”
Lectotype.—The Eggers Type, evidently a male, USNM 59257.

imitans, Sphaerotrypes

Eggers, 1926: 134.
Type Locality.—“Japan, Takaoberg bei Hachiôji.”
Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
Lectotype.—One of the above, the right hand specimen of two on the same small card point, labeled “Mount Takao” USNM 59238.

imitans, Trigonogenius

Eggers, 1920: 34.
Type Locality.—“Amani (Deutsch-Ostafrika).”
Type Series.—“Eine Anzahl in Sammlung Hagedorn und Eggers.”
Lectotype.—One of the above, USNM 60355.

imitans, Xyleborus

Eggers, 1927b: 404.
Type Locality.—“Insel Mentawai (Si Oban).”
Type Series.—“3 ♂, 3 ♀ im Mus. Genova und Sammlung Eggers.”
Lectotype.—One of the above, females, USNM 60686.

imitator, Webbia

Eggers, 1927a: 105.

Type Locality.—“Philippinen: Masbate, Aroroy.”
Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
Holotype.—The above, USNM 60598.

impressus, Coccotrypes

Eggers, 1936a: 632.
Type Locality.—“Singapore.”
Type Series.—“Type und Cotype in coll. Eggers.”
Holotype.—The above Type, a female, USNM 60611.

inarmatus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 209.
Type Locality.—“Sumatra, Tenasserim und Carin Cheba.”
Type Series.—“... 4 Stück in Museo Civico Genova und Sammlung Eggers.”
Lectotype.—One of the above, from Tenasserim, a female, USNM 60734.

insularis, Cnesinus

Eggers, 1940b: 138.
Type Locality.—“Guadeloupe (Coubeyre; Environ de Trois-Rivières).”
Type Series.—“Typen und Cotypen in coll. Eggers, Cotypen im Museum Paris und im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”
Lectotype. One of the above Types, USNM 60318.

insularis, Coccotrypes

Eggers, 1940b: 129.
Type Locality.—“Guadeloupe (Trois-Rivières und Coubeyre); Martinique ...,”
Type Series.—“Type und Cotype in Sammlung Eggers und im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”
Lectotype.—The front one of two specimens on the same card point, a female, labeled “3 -Riv.” without other locality data, USNM 60612.

insularis, Ips

Eggers, 1923b: 164.
Type Locality.—“Key Inseln.”
Type Series.—“... 3 ♂, 3 ♀, von Camillo Schaufuss erhalten, in meiner Sammlung.”
Lectotype.—One of the above males, USNM 60265.

insularis, Phloeotribus

Eggers, 1940b: 123.

Type Locality.—“Guadeloupe (3 Rivières).”

Type Series.—“♂ ♀ Typen, auch 2 Cotypen in Sammlung Eggers; Cotypen im Museum Paris, in der Sammlung Fleutiaux und im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”

Lectotype.—One of the above female Types, USNM 60863.

insularis, Sphaerotrypes

Eggers, 1927a: 74.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan.”

Type Series.—“1 Weib, Type, in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 59239.

insulindicus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 177.

Type Locality.—“Neu Guinea (Südost), Paumoufluss.”

Type Series.—“... 2 Stück im Museo Civico Genova und Sammlung Eggers. Ein drittes etwas grösseres Stück von Moroka (S.O.N.G.) ist ganz kahl ... 2 Stücke von Kuranda (Australien).”

Lectotype.—One of the above—Eggers specimens from Paumotu River, South East New Guinea, a female, USNM 60706.

intermedius, Strombophorus

Eggers, 1920: 117.

Type Locality.—“Kamerun.”

Type Series.—“... ein Stück in Sammlung Schreiner.”

Holotype.—The above, USNM 59109.

intermedius, Xyleborus

Eggers, 1923b: 201.

Type Locality.—“Deutsch Neu Guinea (Maifluss) und Neu Pommern (Ralum).”

Type Series.—“... je 1 Type in Berl. Zool. Museum und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—The above Eggers type, from Ralum, New Britain, a female, USNM 60726.

intersestosus, Stephanoderes

Eggers, 1928b: 85.

Type locality.—“Brazil, São Paulo (Umgegend der Stadt).”

Type series.—“Typen in diesem Museum [Museum Paulista] und Sammlung Eggers, Einige Stücke von Guadeloupe (Val Canard) und von Ostbolivien in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—The Eggers Type, the upper of two on the same pin, a female, USNM 60153.

irkutensis, Pityogenes

Eggers, 1910b: 38.

Type locality.—“Irkutsk.”

Type series.—“Ein Pärchen in meiner Sammlung, von Herrn T. O. Jurinski bei Irkutsk gefunden.”

Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60291.

javanus, Hylesinus

Eggers, 1923b: 135.

Type Locality.—“Buitenzorg auf Java.”

Type Series.—“Eine Anzahl in Sammlung Hagedorn und Eggers”

Lectotype.—One of the above specimens, a male, USNM 59208.

javanus, Scolytplatypus

Eggers, 1923b: 164.

Type Locality.—“Java.”

Type Series.—“Java (Coll. Hagedorn, 1 ♂, 4 ♀); 1 ♀ Tambang Salida auf Sumatra im Leidener Museum, Sammler Weyers. 1 ♂ von sibolangit auf Java (Sammler Corporaal) in meiner Sammlung.”

Lectotype.—The Eggers (Hagedorn) specimen from “Java,” a female, USNM 60592.

javanus, Stephanoderes

Eggers, 1908d: 215.

Type Locality.—“hab. Java, insula asiatica in fungis.”

Type Series.—“Specimina sex in coll. Fiori (Bologna), Eggers, Hagedorn (Hamburg).”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60154.

javanus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 188.
 Type Locality.—“Java.”
 Type Series.—“4 Stücke in Sammlung Hagedorn und Eggers.”
 Lectotype.—One of the above specimens, a female, USNM 60703.

kleinei, Pycnarthrus

Eggers, 1949–50: 151.
 Type Locality.—“Brazil (Corumba, im Staate Matto Grosso).”
 Type Series.—“Type und eine grössere Reihe in Coll. Eggers.”
 Lectotype.—One of the above bearing Eggers’ Type label and marked by him as a male, USNM 69628.

laevicollis, Problechilus

Eggers, 1932d: 230.
 Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60234.

laevis, Strombophorus

Eggers, 1919 [1920]: 232.
 Type Locality.—“Fundort: Kamerun.”
 Type Series.—“1 Stück in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above USNM 59110.

laevis, Xyleborus

Eggers, 1923b: 201.
 Type Locality.—“Kendal auf Java.”
 Type Series.—“... einige Stücke in Sammlung Hagedorn und Eggers. 1 Stück von Ralum (Neupommern) im Berliner Zool. Museum.”
 Lectotype.—One of the above specimens from Kendal, Java, a female, USNM 60688.

***latecavatus, Xyleborus amphicranoides* var.**

Eggers, 1927a: 95.
 Type Locality.—“... Mount Banahao und Los Baños (Luzon) und Subbaan (Mindoro)”
 Type Series.—“In der Böttcher’schen Ausbeute von den Philippinen finde ich drei abweichende Stücke”
 Lectotype.—The above, from Mount Banahao, Luzon, a female, USNM 60749.

latisulcatus, Xyleborus

Eggers, 1940d: 142.
 Type Locality.—“Java (Batoerraden, G. Slamet ...)”
 Type Series.—“Type ... in coll. Eggers. Cotypen in coll. Drescher.”
 Holotype.—The above Type, a female, USNM 60698.

latus, Cryphalus

Eggers, 1929c: 10.
 Type Locality.—“Ussuri.”
 Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60300.

leonii, Eccoptogaster (Scolytus)

Eggers, 1908c: 10.
 Type Locality.—“Cerchio in Italiae provincia Aquilensi.”
 Type Series.—“Specimina compluria in coll. Eggers legit G. Leoni”
 Lectotype.—One of the above, a male, USNM 70152.

liber, Xyleborus

Eggers, 1923b: 202.
 Type Locality.—“Ralum auf Neupommern (Neubritannien).”
 Type Series.—“2 Typen im Berl. Zool. Museum und Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60723.

limbatum, Hylocurosoma

Eggers, 1943a: 370.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60334.

linearis, Thamnophthorus

Schedl, 1938: 174.
 Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, labeled “Conophthorus linearis” in Schedl’s handwriting, USNM 60665.

lineatopunctatus, Xyleborus

Eggers, 1927b: 401.
 Type Locality.—“Neu Guinea.”

Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”
Holotype.—The above, a female, USNM 60739.

lineatus, Stephanoderes

Eggers, 1927e: 175.
Type Locality.—“Belg.-Congo: Banana.”
Type Series.—“... 1 Type in Sammlung Eggers; Ostafrika: Kirumba, 1 Cotype in Sammlung Methner”
Holotype.—The above Type, a female, USNM 60155.

longicollis, Cnesinus

Eggers, 1940b: 137.
Type Locality.—“Guadeloupe.”
Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
Holotype.—The above, USNM 60319.

longicollis, Dryocoetes

Eggers, 1941b: 121.
Type Locality.—“Lensahn, Ostholstein (Grosser Bruch 4.1925).”
Type Series.—“Type in meiner Sammlung.”
Holotype.—The above, USNM 60189.

longicollis, Thamnurgides

Eggers, 1927b: 397.
Type Locality.—“Deutsch Neu Guinea.”
Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
Holotype.—The above, USNM 60200.

longior, Poecilips

Eggers, 1927a: 83.
Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Mountain, Balbalon.”
Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
Lectotype.—The upper of two Types on the same pin, USNM 60215.

longior, Xyleborus

Eggers, 1923b: 171.
Type Locality.—“Deutsch Neu Guinea (Maifluss und Augustafluss).”
Type Series.—“2 Typen im Zool. Museum Berlin und Sammlung Eggers.”
Lectotype.—One of the above Eggers Types, from Maifluss, New Guinea, a female, USNM 60844.

longipilum, Ctonoxylon

Eggers, 1935b: 308.
Type Locality.—“Brit. Ostafrika (Mulange).”
Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
Holotype.—The above, a female, USNM 60340.

longipilus, Xyleborus

Eggers, 1926: 146.
Type Locality.—“Kumanotaira bei Karusiawa.”
Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
Lectotype.—One of the above, the left hand one of three specimens on the same card point, a female, USNM 60732.

longus, Ernoporus

Eggers, 1926: 136.
Type Locality.—“Tomakomai.”
Type Series.—“2 Typen in Sammlung Eggers.”
Lectotype.—One of the above, USNM 60294.

lunulatus, Phloeoborus

Eggers, 1943b: 242.
Type Locality.—“Brasil.”
Type Series.—“Type: ♀ Brasil, in coll. Eggers; Type ♂ Brasil (Jatahy im Staate Goyaz) in coll. Strohmeier des Deutschen Entom. Instituts, Berlin-Dahlem”
Lectotype.—The above female from Brasil, without further data, USNM 59068.

luzonicus, Scolytoplatypus

Eggers, 1935a: 244.
Type Locality.—“Philippinen (Luzon, Benguet, Baguio).”
Type Series.—“Type und Cotypen in Sammlung Eggers, Cotypen in Sammlung Bureau of Science, Manila.”
Holotype.—The above Type, a female, USNM 53869.

luzonicus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 174.
Type Locality.—“Mt. Makiling, Insel Luzon, Philippinen.”
Type Series.—“2 Typen im Dresdener Museum und Sammlung Eggers.”
Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 53873.

major, *Dendrocranulus*

Schedl, 1938: 170.

Type Locality.—“Bolivien, Cochabamba.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und Schedl.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, USNM 60352.

major, *Negritus*

Eggers, 1927a: 69.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Surigao, Surigao. Basilan.”

Type Series.—“2 Stück in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, from Surigao, USNM 60349.

major, *Prionosceles*

Eggers, 1928b: 86.

Type Locality.—“Bolivia.”

Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60360.

major, *Scolytodes*

Eggers, 1943a: 361.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60400.

mandli, *Eccoptyogaster*

Eggers, 1922a: 13.

Type Locality.—“Werchne-Udinsk in Transbaikalien.”

Type Series.—“Ein Stück jetzt in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above, a male, USNM 60417.

mandschuricus, *Cryphalus*

Eggers, 1929c: 10.

Type Locality.—“Ussuri.”

Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers.”

Lectotype.—A specimen of each sex was indicated as Type by Eggers. The Lectotype is a male, USNM 60301.

mandshuricus, *Hylesinus*

Eggers, 1922a: 15.

Type Locality.—“Mandschurei.”

Type Series.—“Zwei Stücke erhielt ich von Paul Spessiweff.”

Lectotype.—One of the above, USNM 59209.

mangiferae, *Hypocryphalus*

Eggers, 1928b: 85.

Type Locality.—“Brasil.”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—The upper of two specimens on the same pin, a male, USNM 60177.

marginatus, *Xyleborus*

Eggers, 1927a: 91.

Type Locality.—“Philippinen: Mindoro, Subaan.”

Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers ... Cotypen in Sammlung Bureau of Science, Manila, und Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60699.

martiniensis, *Stephanoderes*

Eggers, 1941a: 99.

Type Locality.—“Insel Martinique (St. Pierre).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers, mehrere Exemplare auch in coll. Fleutiaux.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60156.

mediterraneus, *Eccoptyogaster*

Eggers, 1922a: 121.

Type Locality.—Sebastopol (Krim.), Adana (Kleinasien), Teboursouk (Tunis), Sidi bel Abbas (Algier), Sizilien”

Type Series.—“... in meiner Sammlung.”

Lectotype.—A specimen from Adana, Asia Minor, evidently a male, USNM 60418.

medius, *Prionosceles*

Eggers, 1928b: 89.

Type Locality.—“Ostbolivien.”

Type Series.—“3 Stücke in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above bearing the locality record Cochabamba, Bolivia, USNM 60361.

medius, *Webbia*

Eggers, 1927a: 104.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz

Lanao, Kolambugan. Mindoro, Subaan. Negros, Provinz Occidental Negros, Fabrica."

Type Series.—"Typen in Sammlung Eggers und Bureau of Science, Manila; 1 Stück in Sammlung Eggers auch von Süd Sumatra."

Lectotype.—One of the above Eggers Types, from Subaan, Mindoro, USNM 29126.

melas, Xyleborus

Eggers, 1927a:93.

Type Locality.—"Philippinen: Luzon, Provinz Mountain, Balaban."

Type Series.—"Typen in Sammlung Eggers."

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60842.

meridionale, Trypodendron

Eggers, 1940c:38.

Type Locality.—"Kleinasien (Ayancik)."

Type Series.—"Rumänien (Biharfüred, leg. Bokar. ♀-Type ...)... Kleinasien (Ayancik) hier sammelte Dr. Schimitschek eine Reihe ♂ und ♀ in *Abies bornmülleriana*. Type ♂ in meiner Sammlung. ♂ und ♀ Cotypen in Sammlung Schimitschek."

Lectotype.—The above Type male, USNM 60642.

mindoroensis, Hypocryphalus

Schedl, 1943: 39.

Type Locality.—"Philippinen, San Theodoro."

Type Series.—"Typen in Sammlung Eggers und Schedl."

Lectotype.—One of the above Eggers Types, the upper of two on the same pin. USNM 60178.

minimus, Cryphalus

Eggers, 1927: 76.

Type Locality.—"Philippinen: Luzon, Provinz Camarines Sur, Mount Isarog."

Type Series.—"Typen in Sammlung Eggers."

Lectotype.—One of the above, the upper of three on the same pin, a male, USNM 29108.

minor, Anthonocerus

Eggers, 1935e:332.

Type Locality.—"Bolivien (Cochabamba)."

Type Series.—"Type in meiner Sammlung."

Holotype.—The above, a male, USNM 60376.

minor, Chramesus

Eggers, 1949-50:144.

Type Locality.—"Brazil (Corumba) im Staate Matto Grosso)."

Type Series.—"1 ♂, ♀ Typen in coll. Eggers."

Lectotype.—The above male, USNM 69629.

minor, Craniodicticus

Eggers, 1936a: 635.

Type Locality.—"Indien, Coorg: Mercara."

Type Series.—"Type und Cotype in coll. Eggers."

Holotype.—The above Type, USNM 59074.

minor, Cryphalomorphus

Eggers, 1927a:76.

Type Locality.—"Philippinen: Luzon, Manila."

Type Series.—"Typen in Sammlung Eggers."

Lectotype.—One of the above, USNM 60876.

minor, Dendurgus

Eggers, 1923b: 150.

Type Locality.—"Buitenzorg, auf Java, Botanischer Garten."

Type Series.—"Typen in den Museen Genova, Hamburg und Sammlung Eggers."

Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60222.

minor, Prionosceles

Eggers, 1928b: 89.

Type Locality.—"Ostbolivien."

Type Series.—"2 Stück in Sammlung Eggers."

Lectotype.—One of the above, bearing the locality record, Cochabamba, Bolivia, USNM 60362.

minor, Strombophorus

Eggers, 1919[1920]: 233.

Type Locality.—"Kamerun."

Type Series.—"1 Stück in Sammlung Schreiner."

Holotype.—The above, USNM 59111.

minusculus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 212.

Type Locality.—"Engano (Bua Bua)."

Type Series.—"Engano (Bua Bua) in Mus. Civ.

Genova und Sammlung Eggers; Java, Sammlung Eggers; Neu Guinea (Moroka, Bujakori) in Mus. Civ. Genova."

Lectotype.—One of the above, from Engano, a female, USNM 60773.

montanum, *Ctonoxylon*

Eggers, 1922c: 170.

Type Locality.—"Buea, Kamerun."

Type Series.—"Type in Sammlung Eggers."

Holotype.—The above, a female, USNM 60341.

moreirai, *Coccotrypes*

Eggers, 1928b: 86.

Type Locality.—"Brazil, Guaxupê (Minas Geraes)."

Type Series.—No comment on disposition of type material.

Lectotype.—A female from the Eggers collection bearing his Type label, USNM 60613.

morio, *Stephanoderes*

Eggers, 1940a: 101.

Type Locality.—"Congostaat (Lusambo)."

Type Series.—"Typen u. Cotypen in meiner Sammlung; von Lusambo auch im Congo Museum; von den andern beiden Fundorten im British Museum, bisher von mir falsch *St. magnus* genannt."

Lectotype.—One of the above Types, a female, USNM 60158.

morio, *Xyleborus*

Eggers, 1923b: 207.

Type Locality.—"Neu Guinea."

Type Series.—"1 Stück im Museo Civico Genova und 2 Stücke vom Kaiserin Augustafluss im Berliner Zool. Museum und Sammlung Eggers."

Lectotype.—One of the above, from Kaiserin Augustafluss, USNM 60845.

moseri, *Sphaerotrypes*

Eggers, 1927a: 73.

Type Locality.—"Philippinen: Mindanao, Provinz Zamboanga, Port Banga."

Type Series.—"Philippinen: Mindanao, Provinz Zamboanga, Port Banga; Provinz Surigao, Surigao; Sammler Böttcher, in Sammlung Eggers:

Provinz Lanao, Kolambugan, Sammler Banks, in derselben Sammlung und im Bureau of Science, Manila."

Lectotype.—One of the specimens from Port Banga, the upper of two on the same pin, a male, USNM 29123.

mucronatus, *Webbia*

Eggers, 1927a: 107.

Type Locality.—"Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan."

Type Series.—"1 Type in Sammlung Eggers."

Holotype.—The above Type, USNM 60701.

nanus, *Coccotrypes*

Eggers, 1920: 33.

Type Locality.—"Kamerun."

Type Series.—"... in Sammlung Hagedorn und Eggers und im Deutschen Entom. Museum in Dahlem ... Unter den zahlreichen Stücken"

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, USNM 29120.

natalensis, *Xyleborus*

Schaufuss II, 1891: 20.

Type Locality.—Natal.

Type Series.—"Ein Exemplar aus Natal."

Holotype.—The above, a female, USNM 60717.

neivai, *Xyleborus*

Eggers, 1928b: 96.

Type Locality.—"Brazil, São Paulo (Hauptstadt)."

Type Series.—"Typen: ... je 1 ♂, mehrere ♀, in Sammlung Eggers und im Instituto Biologico in São Paulo. 2 Cotypen aus São Leopoldo in Museum Dresden. 1 Stück aus São Paulo auch im Nationalmuseum in Prag."

Lectotype.—One of the above Types, a female, USNM 60772.

nepos, *Xyleborus*

Eggers, 1923b: 198.

Type Locality.—"Java."

Type Series.—"Typen (♂ und ♀) in Sammlungen Hagedorn und Eggers. Sumbawa, 1 Stück in Sammlung Eggers. Celebes und Neu Guinea, je 1 Stück im Museo Civico Genova."

Lectotype.—One of the above Eggers female Types, USNM 60746.

niger, Pityophthorus

Schedl, 1938: 187.
 Type Locality.—“Porto Alegre.”
 Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60256.

nüsimai, Hyorrhynchus

Eggers, 1926: 133.
 Type Locality.—“Urakawa (Hakodate).” [Japan]
 Type Series.—“1 ♀ Type und ein Beschädigtes
 Stück in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 59071.

nitidicollis, Phthorophloeus

Eggers, 1943a: 347.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60882.

nitidus, Cnesinus

Eggers, 1943a: 376.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers,
 Cotypen auch im Museum Paris.”
 Lectotype.—A male (a specimen of each sex was
 indicated as Type), USNM 60320.

nitidus, Ips

Eggers, 1933c: 101.
 Type Locality.—“Nitou Tatsienlu, Szechuan,
 China.”
 Type Series.—“Type und Cotypen in meiner
 Sammlung. Cotypen und sine grosse Reihe im
 Besitze von Emm. Reitter. Ein Stück mit
 Bezeichnung “China” befindet sich auch in
 meiner Sammlung.”
 Holotype.—The above Type, a male, USNM
 60266.

notatus, Xyleborus

Eggers, 1941a: 107.
 Type Locality.—“... Guadeloupe ... Cuba (Habaña);
 San Dominica (Moca); Panama (Zativa und
 Volcan Chiquiri); Costa Rica.”
 Type Series.—“Type und Cotypen ...; alle in coll.
 Eggers.”
 Holotype.—The above Type, a female, labeled
 “3 - Riv., Guadeloupe,” USNM 60766.

novagranadensis, Xyleborus

Eggers, 1941a: 103.
 Type Locality.—“Venezuela (Neu Granada) ...
 Guadeloupe (Trois-Rivieres).”
 Type Series.—“♀ Type in coll. Eggers, ♀ Cotypen
 und ♂ Type vom Guadeloupe (Trois-Rivieres)
 im Museum Paris; ♂ Cotype auch in coll.
 Eggers.”
 Holotype.—The above female Type, USNM
 60677.

novus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 190.
 Type Locality.—“Mentawai (Sipora).”
 Type Series.—“2 Stücke im Museum Genova und
 Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers specimens,
 a male, USNM 60742.

oblongus, Poecilips

Eggers, 1927a: 83.
 Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Mount
 Polis.”
 Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—The upper of two specimens mounted
 on the same pin, USNM 60217.

obscurus, Microcorthylus

Eggers, 1935c: 155.
 Type Locality.—“Bolivien, Cochabamba.”
 Type Series.—“Type und Cotypen in meiner
 Sammlung. 2 Cotypen im Museum Paris; 1
 Cotype in coll. Schedl.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60367.

obscurus, Neodryocoetes

Eggers, 1936c: 390.
 Type Locality.—“Brasilien, Sta. Catharina,
 Blumenau.”
 Type Series.—“(Type und Cotypen) in meiner
 Sammlung; ausserdem 1 Ex. von Paraguay,
 Asuncion, Balzar leg., im museum von Genua.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60646.

obtusum, Trypodendron

Eggers, 1939a: 121.
 Type Locality.—“Japan (Karafuto, Nopporo).”
 Type Series.—“Typen und Cotypen in coll. Eggers,

Cotypus im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”
 Lectotype.—One of the above Types, a male, USNM 60643.

obtusus, Xyleborus

Eggers, 1923b:172.
 Type Locality.—“Bandar Baroe auf Sumatra.”
 Type Series.—“1 Stück in meiner Sammlung.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60691.

occidentalis, Camptocerus

Eggers, 1928b:91.
 Type Locality.—“Bolivia (Yungas de la Paz).”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60631.

opacicolis, Phloeotribus

Eggers, 1943a:353.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers, Cotype im Museum Paris.”
 Holotype.—The above Type, a male, USNM 60864.

opacus, Diamerus

Eggers, 1923b:132.
 Type Locality.—“Mts. Singalang und Si Rambé auf Sumatra.”
 Type Series.—“... 2 Stücke im Museum Genua und Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, from Si Rambé, Sumatra, USNM 59104.

orientalis, Dactylipalpus

Eggers, 1933f:16.
 Type Locality.—“Mpanga Forest, Toro, Uganda.”
 Type Series.—No comment regarding disposition of Type material.
 Lectotype.—A specimen from the Eggers collection bearing Eggers' Type label, a male, USNM 59065.

orientalis, Eccoptogaster

Eggers, 1910a:557.
 Type Locality.—“Elisabetpol, Caucasiae rossicae.”
 Type Series.—“Ich erhielt einige Stücke von Babadjanides aus Elisavetpol im Kaukasus.”

Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60419.

orientalis, Pelicerus nitidus, var.

Eggers, 1923b:217.
 Type Locality.—“Neu Guinea (Salvatti).”
 Type Series.—“3 Typen im Museo Civico Genova und Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60658.

orientalis, Xyleborus

Eggers, 1933e:54.
 Type Locality.—“Wladiwostok.”
 Type Series.—“Type und Cotypen in Sammlung Eggers. Cotypen in Sammlung V. Stark.”
 Holotype.—The above Type, a female, USNM 60735.

ovatus, Dryotomus

Eggers, 1943a:347.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, a male, USNM 60890.

papuanus, Ozopemon

Eggers, 1923b:157.
 Type Locality.—“Haveri und Paumomufluss in Südost-Neu Guinea.”
 Type Series.—“2 Typen im Museum Genova und Sammlung Eggers. Einige weitere Cotype im Berliner Museum vom Kaiserin Augustafluss in Deutsch Neu Guinea. 2 Stücke im Dahlemer Museum von den Key Inseln, Sammler H. C. Siebers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, from Paumomu River, New Guinea, USNM 60625.

papuanus, Pelicerus

Eggers, 1923b:217.
 Type Locality.—“Deutsch Neu Guinea (Kaiserin Augustafluss).”
 Type Series.—“4 Typen, 2♂, 2♀, im Berliner Zool. Museum und Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, a male, USNM 60659.

paraguayensis, Dendrosinus

Eggers, 1930b: 168.

Type Locality.—“Paraguay.”

Type Series.—“Paraguay, Sammler K. Fiebrig, 1 Type in Sammlung Eggers; ferner Brasil, São Paulo (P. Epitacio oder Tiberisá am Parana), ... je 1 Cotype im Mus. Hamburg und Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above Eggers Type, a male, USNM 60229.

parallelus, Dendrocranulus

Schedl, 1938: 172.

Type Locality.—“Guadeloupe, Env. de Trois Rivières.”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60353.

parvipunctatus, Xyleborus

Eggers, 1943a: 387.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, a female, USNM 60684.

parvum, Hylocurosoma

Eggers, 1943a: 371.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers, Cotypen auch im Museum Paris.”

Holotype.—The above Type, USNM 60335.

paucegranulatus, Scolytoplatypus

Eggers, 1935a: 242.

Type Locality.—“Java (Batoerraden, G. Slamet).”

Type Series.—“... 1 ♂, 2 ♀ Typen in meiner Sammlung, 1 ♂, 1 ♀ Cotypen in Sammlung Drescher.”

Lectotype.—One of the above female Types, from Sumatra, USNM 60594.

penicillatus, Xyleborus

Hagedorn, 1910:7.

Type Locality.—“Sumatra et Java.”

Type Series.—“... Foerster legit, Fischer dedit. 2 Specimina in coll. Hagedorn.”

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60843.

peregrinus, Eccoptogaster

Eggers, 1908d:214.

Type Locality.—Unknown (Later, Eggers, 1912a: 47, stated it to be from Sos, Gallia meridionalis).

Type Series.—“Specimen unicum, incertae sedis, a domine Desbrocher des Loges datum, in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, a male, USNM 60420.

persimilis, Hylesinus

Eggers, 1927a: 70.

Type locality.—“Philippinen: Mindoro, Provinz Mindoro, Calapan.”

Type Series.—“... je 2 Typen, in Sammlung Eggers und Sammlung Bureau of Science, Manila.”

Lectotype.—One of the Eggers Types, a male, USNM 59210.

persimilis, Xyleborus

Eggers, 1927a: 97.

Type locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Surigao, Surigao.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a female USNM 53875.

peruanus, Scolytopsis

Eggers, 1937: 83.

Type Locality.—“Peru (Marcapata).”

Type Series.—“Typen 2 Weibchen ... jetzt in meiner Sammlung.”

Lectotype.—One of the above, USNM 60629.

philippinensis, Dendurgus

Eggers, 1923b:145.

Type Locality.—“Mt. Makiling, Insel Luzon, Philippinen.”

Type Series.—“4 Stück im Dresdener Zool. Museum und Sammlung Eggers; 7 Stück im Berliner Zool. Museum aus Neu Guinea (Kaiserin Augustaflussgebiet).”

Lectotype.—One of the Eggers specimens, a female, USNM 60223.

philippinensis, Hylesinus

Eggers, 1923b:137.

Type Locality.—“Mt. Banahao Mt. Makiling. Los baños auf Luzon.”

Type Series.—“3 Stück im Museum Dresden und Sammlung Eggers. Ein weiteres Stück von Südost Neu Guinea (Paumomufloss) befindet sich im Museo Civico Genova; 2 von der Insel Fergusson ebenfalls bei Südost Neu Guinea im Hamburger Museum, 2 Stück von Deutsch Neu Guinea im Zool. Museum Berlin. Eine Reihe von den Key Inseln in meiner Sammlung.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens from Luzon, a male, USNM 53871.

philippinensis, Ips

Eggers, 1927a:78.

Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Momungan.”

Type Series.—“In Anzahl in Böttcher's Ausbeute”

Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, a male, USNM 29109.

philippinensis, Pelicerus

Eggers, 1927a:87.

Type Locality.—“Philippinen: Cotanduanes, Provinz Albay, Virac.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, a male, USNM 53881.

piceus, Cryphalus

Eggers, 1926:136.

Type Locality.—“Hokkaido.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Niisima und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60302.

picipennis, Dryocoetes

Eggers, 1926:138.

Type Locality.—“Jozankei (Sapporo).”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, USNM 60190.

picipennis, Phloeotribus

Eggers, 1943a: 352.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type ♂ in coll. Eggers, Cotype ♀ im Museum Paris.”

Holotype.—The above Type, USNM 60865.

pilifer, Problechilus

Eggers, 1932a: 229.

Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60235.

pilosulus, Problechilus

Eggers, 1932d: 234.

Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60236.

pilosulus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 100.

Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling.”

Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers; Cotypen aus Baguio von derselben Insel in Sammlung des Bureau of Science, Manila und Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60689.

pilosus, Cryptocarenus

Eggers, 1937: 81.

Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”

Type Series.—“Type ... in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above, USNM 60248.

pilosus, Hylastinus

Eggers, 1944a: 140.

Type Locality.—“Algier.”

Type Series.—“Die Type (♂?) stammt aus Algier und befindet sich in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above, USNM 59131.

pini, Cryphalus

Eggers, 1921: 39.

Type Locality.—“Kiautschou.”

Type Series.—“Eine ganze Reihe in Sammlung Hagedorn und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a male, USNM 60303.

platypoides, Webbia

- Eggers, 1927a: 105.
 Type Locality.—“Philippinen: Basilan. Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan: Provinz Zamboanga, Port Banga.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, from Port Banga, the upper of two on the same pin, USNM 29125.

polyodon, Xyleborus

- Eggers, 1923b: 196.
 Type Locality.—“Mt. Makiling, Insel Luzon.”
 Type Series.—“2 Stück in Museum Dresden und Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60859.

posticestriatus, Xyleborus

- Eggers, 1939a: 119.
 Type Locality.—“Formosa (Taihoku ...).”
 Type Series.—“Typen in coll. Eggers; Cotypen in coll. Chujo und im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”
 Lectotype.—One of the above Types, a female, USNM 60692.

praeruptus, Pseudothamnurgus

- Eggers, 1925: 158.
 Type Locality.—“Tenasserim (Birma).”
 Type Series.—“je 1 Type im Nationalmuseum Prag und in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—The above Eggers Type, a female, USNM 60664.

praeustum, Pterocyclon

- Eggers, 1941a: 100.
 Type Locality.—“Guadeloupe (Trois Rivières).”
 Type Series.—“Typen ♂ u. ♀ in coll. Eggers. Cotypen in coll. Fleutiaux und Thery.”
 Lectotype.—One of the above male Types, USNM 60374.

pruni, Cryphalus

- Eggers, 1929c: 11.
 Type Locality.—“Ussuri.”
 Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60304.

pseudobicolor, Hexacolus

- Eggers, 1940b: 132.
 Type Locality.—“Guadeloupe (Trois Rivières).”
 Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers. Cotypen im Museum Paris und im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”
 Holotype.—The above Type, a male, USNM 60329.

pseudocylindricus, Xyleborus

- Eggers, 1927b: 402.
 Type Locality.—“Südsumatra.”
 Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60748.

pumilus, Cnesinus

- Eggers, 1931b: 34
 Type Locality.—“Sao Paulo.”
 Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above USNM 60321.

pumilus, Loganius

- Eggers, 1929a: 65.
 Type Locality.—“Costa Rica (Turrialba).”
 Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a male, USNM 60392.

pumilus, Xyleborus

- Eggers, 1923b: 209.
 Type Locality.—“Sumatra.”
 Type Series.—“1 Stück in Sammlung Hagedorn, ein zweites von Java findet sich im Museo Civico Genova.”
 Lectotype.—The above specimen from Hagedorn's collection, a female, USNM 60750.

punctatus, Corthylus

- Eggers, 1943a: 382.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, a female (not a male as stated by Eggers), USNM 60383.

punctatus, Kissophagus

- Eggers, 1932a: 28.
 Type Locality.—“Congo Belge.”
 Type Series.—“Type (abgerieben) in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 59245.

punctatus, Stephanoderes

Eggers, 1924: 101.
 Type Locality.—“Eala (Congostaat).”
 Type Series.—“2 Typen im Congo-Museum Tervueren und Sammlung Eggers. Weitere Stücke sah ich nachträglich”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60160.

puncticollis, Diamerus

Eggers, 1927a: 68.
 Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Rizal, Montalban; Provinz Laguna, Los Baños. Masbate, Aroroy.”
 Type Series.—“Je 1 Stück (2 Männer, 1 Weib); Sammler Böttcher; in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—The above female, from Montalban, Luzon, USNM 59105.

punctipennis, Xyloctonus

Eggers, 1939b: 16.
 Type Locality.—“Somaliland (Basso Genana).”
 Type Series.—“Type und 2 Cotypen in meiner Sammlung.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60346.

pusillum, Hylocurosoma

Eggers, 1943a: 367.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60337.

pusillus, Corthylus

Eggers, 1943a: 380.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, a male, USNM 60384.

pusillus, Hypothenemus

Eggers, 1927e: 173.
 Type Locality.—“Belg.-Congo (Mayumbe).”
 Type Series.—“2 Typen in Congomuseum Tervueren und 1 in Sammlung Eggers. Weitere Stücke von Sankuru ... Kasai ... Lukolela ... Thysville”
 Lectotype.—The above Eggers Type, from Mayumbe, a female, USNM 60172.

pusillus, Neoxyloctonus

Eggers, 1927a: 88.
 Type Locality.—“Philippinen: Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan. Mindoro, San Teodoro.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, from Kolambugan, USNM 29132.

pusillus, Scolytoplatypus

Eggers, 1935a: 243.
 Type Locality.—“Philippinen (Luzon: Baguio und Laguna).”
 Type Series.—“Type und Cotypen in Sammlung Eggers, Cotypen in Sammlung Bureau of Science, Manila.”
 Holotype.—The above Type, a male from Baguio, Luzon, USNM 29133.

pusillus, Strombophorus

Eggers, 1932a: 24.
 Type Locality.—“Congostaat (Mayumbe: Pulu Banzi).”
 Type Series.—“Type und 2 Cotypen in coll. Eggers, 2 Cotypen in coll. Collart.”
 Holotype.—The above Type, USNM 59112.

pusillus, Webbia

Eggers, 1927a: 108.
 Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Mountain, Balbalan.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, USNM 60599.

quadraticollis, Xyleborus

Eggers, 1923b: 197.
 Type Locality.—“Mt. Makiling auf Luzon.”
 Type Series.—“2 Stück im Dresdener Zool. Museum und Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60745.

quadridens, Premnobius

Eggers, 1927e: 183.
 Type Locality.—“Ostafrika (S. Usagara).”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Methner und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, USNM 60243.

quadridentatus, Anchonocerus

Eggers, 1935e: 333.

Type Locality.—“Venezuela.”

Type Series.—“2 Männchen, in meiner Sammlung.”

Lectotype.—One of the above, USNM 60377.

quercicola, Xyleborus

Eggers, 1926: 146.

Type Locality.—“Tokyo.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Niisima und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, the middle one of three on the upper of two card points on the same pin, a female, USNM 60727.

ricini, Xyleborus

Eggers, 1932b: 298.

Type Locality.—“Congostaat: Stanleyville.”

Type Series.—“Type und Cotypen in Sammlung Eggers. Cotypen in Sammlung Collart. Ferner Cotypen aus Lukolela, Sammler H. I. Bredo, im Congo-Museum.”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60763.

rothkirchi, Xyleborus

Eggers, 1920: 45.

Type Locality.—“Soppo (800 m. hoch) in Kamerun.”

Type Series.—“3 Stück im Berl. Zool Museum und in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60841.

rufipes, Xyleborus

Eggers, 1933a: 31.

Type Locality.—“Columbia.” [sic!]

Type Series.—“Type in coll. Eggers; eine Cotype (im Mus. Paris) von Franz Guayana”

Holotype.—The above Type, a female, USNM 60673.

rugicollis, Dryocoetes

Eggers, 1926: 137.

Type Locality.—“Sachalin (Osawa, an Fichte) ... Kurilen”

Type Series.—“Typen in Sammlung Niisima und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, from Osawa, Sachalin, USNM 60191.

rugipennis, Phloeoborus

Eggers, 1942b: 271.

Type Locality.—“San Salvador.”

Type Series.—“♀ Type san Salvador (in coll. Eggers) ... ♂ Type und 1 ♀ Cotype sammelte F. Nevermann in Costa Rica ... in coll. Schedl.”

Lectotype.—The above female Type, USNM 59070.

rugulosus, Loganius

Eggers, 1929a: 64.

Type Locality.—Ostbolivia [The specimen bears the label Cochabamba, Bolivia.]

Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, a female, USNM 60393.

rugulosus, Scolytodes

Eggers, 1943a: 362.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60402.

***rugulosus, Xyleborus dispar* var.**

Eggers, 1922a: 17.

Type Locality.—“Broût Vernet in Frankreich.”

Type Series.—“Ich besitze nun ♂ und ♀ dieser grösseren und gröber skulptierten Form aus Broût Vernet in Frankreich und eine Reihe aus dem sächsischen Erzgebirge.”

Lectotype.—One of the above males, from Broût Vernet, USNM 60672.

saalasi, Pityogenes

Eggers, 1914: 188.

Type Locality.—“Kirchspiel Kittilä im finnischen Lappmarken”

Type Series.—“2 ♂, 1 ♀ in Sammlung Saalas und Eggers.”

Lectotype.—One of the above males, USNM 60290.

sahlbergi, Eccoptogaster

Eggers, 1912c: 204.

Type Locality.—“Dauria (Sibiria orient.).”

Type Series.—“1 ♂ (am Penis deutlich erkennbar), 1 ♀ von F. Sahlberg in Daurien gesammelt, im Museum Zoolog. Helsingfors, mir von Professor John Sahlberg zur Bestimmung übergeben.”
Lectotype.—The above male, USNM 60584 (the specimen has been dissected by Klimesch).

sardus, Thamnurgus

Eggers, 1912b: 114.
Type Locality.—“Sadali ... Asuni”
Type Series.—“... in coll. Doderö und Eggers ... in coll. Leonhard, Eggers und Wichmann” (No mention of the number of specimens).
Lectotype.—One of the Eggers specimens, from Asuni, Sardinia, a male, USNM 60638.

schedli, Xyleborus

Eggers, 1934b: 83.
Type Locality.—“Costarica.”
Type Series.—“Type (Sammlung Eggers) und Cotype (Mus. Hamburg). 1 Cotype ... im Samml. Schedl; 1 andere Cotype ... in Samml. Eggers.”
Holotype.—The above Type, a female, USNM 60768.

schimitscheki, Taphrorychus

Eggers, 1940c: 38.
Type Locality.—“Kleinasien (Ayancyk).”
Type Series.—“Typen in coll. Eggers, Cotypen in coll. Schimitschek.”
Lectotype.—One of the above Types, a male, USNM 60872.

schumensis, Phloeosinus

Eggers, 1922c: 166.
Type Locality.—“Schumewald, Bezirk Wilhelmstal (Deutsch-Ostafrika).”
Type Series.—“Typen in meiner Sammlung.”
Lectotype.—One of the above Types, a male, USNM 59260.

semibrunneus, Chramesus

Eggers, 1949–50 [1951]: 145.
Type Locality.—“Brazil, in Rinde einer *Piptadenia*-Art (Leguminose).”
Type Series.—“♀ Type, ♂ Cotype in coll. Eggers.”
Holotype.—The above Type, USNM 69630.

septentrionalis, Hylastes

Eggers, 1923a: 135.
Type Locality.—“Schweden (Stockholm und Kolleberga)”
Type Series.—No comment on the number of specimens or distribution of types.
Lectotype.—One of the specimens from Stockholm, USNM 59124.

setosus, Cnesinus

Eggers, 1943a: 377.
Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
Type Series.—“Type in coll. Eggers, Cotype in Museum Paris.”
Holotype.—The above Type, USNM 60322.

sexdentatum, Monarthrum

Eggers, 1935c: 83.
Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”
Type Series.—“Typen ♂ ♀ in meiner Sammlung; 2 Cotypen ♂ im Museum von Paris.”
Lectotype.—The above female Type, USNM 60372.

sexdentatus, Anthonocerus

Eggers, 1935e: 331.
Type Locality.—“Columbien [sic!] (Aguatal).”
Type Series.—“Holotype in meiner Sammlung.”
Holotype.—The above, a male, USNM 60378.

sexdentatus, Mimips

Eggers, 1944b: 96.
Type Locality.—“Belgisch-Congo.”
Type Series.—“♂ Type in meiner Sammlung, ♀ unbekannt.”
Holotype.—The above, USNM 60889.

sexdentatus, Xyleborus

Eggers, 1940d: 148.
Type Locality.—“Java (Batoerraden, G. Slamet ...)”
Type Series.—“Type in coll. Eggers: Cotype von Bodjonegro in coll. L. G. E. Kalshoven.”
Holotype.—The above Type, a female, USNM 60675.

siculus, Taphrorychus

Eggers, 1908b: 121.
Type Locality.—“Sicilia insula, Madonie.”

Type Series.—“specimina compluria in coll. Ragusa et in coll. Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a male, USNM 60873.

siculus, Thamnurgus

Eggers, 1912b: 115.

Type Locality.—“Sicilia, insula.”

Type Series.—“Eine Anzahl Käfer in coll. Leonhard und Eggers”

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60640.

similis, Loganius

Eggers, 1929a: 63.

Type Locality.—“Ostbolivia” (the specimen bears the label Cochabamba, Bolivia).

Type Series.—“♂ und ♀ in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—The above male, USNM 60394.

similis, Negritus

Eggers, 1923b: 142.

Type Locality.—Java.

Type Series.—“3 Stücke von Java, 2 in meiner Sammlung, 1 in Sammlung Sampson.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, USNM 59126.

similis, Ozopemon

Eggers, 1927a: 87.

Type Locality.—“Borneo, Sandakan.”

Type Series.—“3 Typen in Sammlung Baker und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, USNM 60626.

similis, Phloeoborus

Eggers, 1942b: 272.

Type Locality.—“Brasilien (Jatahy, Goya)” [labeled correctly-Goyaz].

Type Series.—“Im Osten Südamerikas. ♂ ♀ Type in coll. Eggers, ♂ aus Paraguay, leg. Fiebrig; ♀ Brasilien (Jatahy, Goya). Cotypen”

Lectotype.—The above female from Brasil, USNM 59069.

similis, Prionosceles

Eggers, 1928b: 87.

Type Locality.—“Argentinien und Ostbolivien.”

Type Series.—“... je 1 Stück aus Argentinien und Ostbolivien in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—The above specimen from Argentina, USNM 60363.

similis, Stephanoderes (?)

Eggers, 1922c: 168.

Type Locality.—“S. O. Usagara und Negerengere Deutsch-Ostafrika.”

Type Series.—“6 Typen in Sammlung Methner und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, labeled “S. O. Usagara,” USNM 60162.

siporanus, Xyleborus

Hagedorn, 1910: 11.

Type Locality.—“Sipora in Mentawai.”

Type Series.—“Compluria specimina.”

Lectotype.—One of the above, a female, USNM 60743.

sordicaudulus, Xyleborus

Eggers, 1927a: 91.

Type Locality.—“Philippinen: Palawan, Binaluan.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Linnamiemi (Turku, Finnland) und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60704.

spessiwezzeff, Hylurgops

Eggers, 1914: 187.

Type Locality.—“Ostsibirien.”

Type Series.—“Ich erhielt den Käfer in einigen Stücken von Herrn Paul Spessiwezzeff,”

Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, a male, USNM 59127.

spiculatus, Trypophloeus

Eggers, 1927c: 122.

Type Locality.—“Klana (Krain).”

Type Series.—“Typen (2 ♂, 1 ♀) aus Klana (Krain) ... Cotypen ... alle in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above Types, a male, USNM 60310.

spinifer, Ctonoxylon

Eggers, 1920: 39.

Type Locality.—“Kamerun.”

Type Series.—“1 Stück in Sammlung Schreiner; 2 Stück (v. Rothkirch) in Zool. Museum Berlin, 1 Stück in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60343.

spinifer, Premnobius

Eggers, 1927e: 182.
 Type Locality.—“Congogebiet.”
 Type Series.—“1 Stück in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, which bears the additional locality record: Luebo, USNM 60244.

spinus, Strombophorus

Eggers, 1932a: 25.
 Type Locality.—“Congostaat (Mayumbe: Pulu Banzi).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 59113.

splendidus, Xyleborus

Schaufuss, 1897a: 111.
 Type Locality.—“Amazonas.”
 Type Series.—No comment on number of specimens or distribution of types.
 Lectotype.—A specimen from the Schaufuss collection bearing Schaufuss' and Eggers' Type labels and Eichhoff's handwritten identification label, a female, USNM 60759.

squamulosus, Xyleborus

Eggers, 1923b: 193.
 Type Locality.—“Pangherang-Pisang auf Sumatra und Si Oban auf Metawei.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und in Museo Civico Genova”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, from Sumatra, USNM 59242.

starki, Blastophagus

Eggers, 1929b: 104.
 Type Locality.—“Ussuri.”
 Type Series.—“2 Typen in meiner Sammlung.”
 Lectotype.—One of the above, USNM 59242.

stierlini, Cryphalus

Eggers, 1911b: 121.
 Type Locality.—Italy.

Type Series.—“Specimina duo ex Italia; 1 in coll. Stierlin, 1 in coll. Eggers.”
 Lectotype.—The above Eggers specimen, USNM 60307.

striatus, Bothrosternus

Eggers, 1933a: 16.
 Type Locality.—“Venezuela.”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60314.

striatus, Chramesus

Eggers, 1943a: 344.
 Type Locality.—“Bolivien (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 59249.

striatus, Diamerus

Eggers, 1927a: 67.
 Type Locality.—“Philippinen: Mindoro, San Teodoro.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”
 Lectotype.—One of the above, a female, the upper of two specimens on the same pin, USNM 59106.

striatus, Dryocoetes

Eggers, 1933d: 8.
 Type Locality.—“Wladiwostok.”
 Type Series.—“Wladiwostok an *Abies nephrolepis*. Type und Cotypen in meiner Sammlung, Cotypen auch in Sammlung V. Stark, von dem ich den Käfer erhielt.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60192.

striatus, Hexacolus

Eggers, 1934b: 79.
 Type Locality.—“Costa Rica (Turrialba).”
 Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60330.

striatus, Hylesinus

Eggers, 1933d: 4.
 Type Locality.—“Wladiwostok.”
 Type Series.—“Wladiwostok und von anderen Fundorten im Ussurigebiet. Ich erhielt den Käfer von Professor V. Stark.”
 Lectotype.—One of the above, from Vladivostok, a male, USNM 59211.

striatus, Phloeotribus

Eggers, 1943a: 351.
 Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”
 Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers, eine Cotype im Museum Paris.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, the upper of two on the same pin, a female, USNM 60867.

striatus, Problechilus

Eggers, 1932d: 227.
 Type Locality.—“Mexico (Canelas).”
 Type Series.—“Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60237.

striatus, Thamnurgides

Eggers, 1927a: 82.
 Type Locality.—“Philippinen: Luzon, Provinz Laguna, Mt. Maquiling.”
 Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60202.

subacuminatus, Poecilips

Eggers, 1927b: 399.
 Type Locality.—“Deutsch Neu Guinea.”
 Type Series.—“1 Type in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60220.

subasperulus, Corthylus

Eggers, 1940b: 141.
 Type Locality.—“Guadeloupe.”
 Type Series.—“Typen (1 ♂, 2 ♀) in coll. Eggers.”
 Lectotype.—One of the above female Types, USNM 60386.

subasperulus, Xyleborus

Eggers, 1935b: 310.
 Type Locality.—“Kamerun (Victoria).”
 Type Series.—“♀ Type in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above, USNM 60736.

subconcentralis, Pityophthorus

Schedl, 1938: 183.
 Type Locality.—“Trois Rivières, Guadeloupe.”
 Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers und Schedl.”
 Lectotype.—One of the above Eggers Types, the

right hand one of two mounted on the same, small card point, USNM 60261.

subcostatus, Hylesinus

Eggers, 1923b: 137.
 Type Locality.—“Sumatra.”
 Type Series.—“1 Stück in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 59212.

subcostatus, Xyloctonus

Eggers, 1939b: 15.
 Type Locality.—“Deutsch Ost Africa (Bez. Tabora: Ngulu).”
 Type Series.—“Type und Cotype in Sammlung Eggers, andere Stücke vom gleichen Fundort in Sammlung Methner im Zool. Museum Berlin.”
 Holotype.—The above Type, USNM 60347.

subcrenulatus, Xyleborus

Eggers, 1932b: 301.
 Type Locality.—“Congostaat (Madimba).”
 Type Series.—“1 Type ... jetzt in Sammlung Eggers.”
 Holotype.—The above, a female, USNM 60840.

subcribrosus, Crypturgus

Eggers, 1933d: 5.
 Type Locality.—“Bruck a.d. Mur.”
 Type Series.—“Type: Bruck a.d. Mur (Steiermark). Cotypen: Graz (Steiermark), Olovo (Bosnien), Banja Bystrica (Tschechoslowakei), Sachsenwald bei Hamburg, Kittilä (Finnland), Briansk und Moskau (Russland) und Ussurigebiet in Sibirien. Cotypen von Briansk in coll. Stark, Leningrad; die übrigen Fundorte in coll. Eggers.”
 Holotype.—The above Type, a female, USNM 60655.

submarginatus, Xyleborus

Eggers, 1940d: 150.
 Type Locality.—“Java (Batoerraden, G. Sfamet) ...”
 Type Series.—“Typen in coll. Eggers, Cotypen in coll. Drescher.”
 Lectotype.—One of the above Types, a female USNM 60753.

sublaevis, Webbia

Eggers, 1927a: 104.

Type Locality. — "Philippinen: Mindanao, Provinz Surigao, Surigao."

Type Series. — "Type in Sammlung Eggers."

Holotype. — The above, USNM 60600.

subparallelus, Xyleborus

Eggers, 1940d: 151.

Type Locality. — "Java (Batoerraden)."

Type Series. — "Typen in coll. Eggers, Cotypen in coll. Drescher."

Lectotype. — One of the above Types, a female, USNM 60751.

subsulcatus, Diamerus

Eggers, 1923b: 130.

Type Locality. — Somerset, Australia.

Type Series. — "Neu Guinea; Australia (Somerset) je ein ♀ von L. M. d'Albertis gesammelt; Ternate 1 ♂ (Sammler Beccari). Typen in Museo Civico Genova und Sammlung Eggers."

Lectotype. — The above female Type from Somerset, Australia, USNM 59107.

sulcipennis, Xyleborus

Eggers, 1932b: 299.

Type Locality. — "Congostaat. Likimi: Gundji."

Type Series. — "Type in Sammlung Eggers."

Holotype. — The above, a female, USNM 60674.

sumatranus, Hylurgulus

Eggers, 1927b: 393.

Type Locality. — "Süd Sumatra (Wai Lima)."

Type Series. — "... je 1 Type im Museum Buitenzorg und in Sammlung Eggers; 3 Stücke von Tenasserim (coll. Helfer 1830) im National Museum Prag und Sammlung Eggers."

Lectotype. — The above Eggers Type, from Wai Lima, a female, USNM 60239.

sundaensis, Dendrugus

Eggers, 1923b: 145.

Type Locality. — "Tambang Salida (Ost Sumatra)."

Type Series. — "2 Stück im Leidener Museum und Sammlung Eggers."

Lectotype. — One of the above Eggers specimens, a female, USNM 60225.

sundaensis, Xyleborus

Eggers, 1923b: 175.

Type Locality. — "Poerwakarta auf Java."

Type Series. — "1 ♂, 2 ♀ in Sammlung Hagedorn und Eggers."

Lectotype. — One of the above Eggers females, USNM 60707.

suturalis, Corthylus

Eggers, 1931b: 41.

Type Locality. — "Brasilien (Espiritu Santo)."

Type Series. — "Brasilien (Espiritu Santo), ♂ und ♀ Type und Cotypen in coll. Eggers: Brasilien (Sao Paulo), 3 beschädigte Stücke im Museum Prag (Sammler Mraz). Ostbolivia, 2 ♂ Cotypen in der Sammlung Eggers."

Lectotype. — The above male Type, USNM 60387.

suturalis, Phloeotribus

Eggers, 1943a: 349.

Type Locality. — "Bolivia (Cochabamba)."

Type Series. — "Type in coll. Eggers."

Holotype. — The above, a female, USNM 60866.

swaini, Hylastes

Eggers, 1934a: 25.

Type Locality. — "Ostkanada ... Frater (Ontario)."

Type Series. — "Type and 3 Cotype aus Frater (Ontario) gab mir Swaine, dem ich den Käfer widme. 1 Cotype aus Minnesota (Lake Itasca) auch in meiner Sammlung."

Holotype. — The above Type, a male, USNM 59125.

talauticus, Xyleboricus

Eggers, 1923b: 214.

Type Locality. — "Talaut Inseln (zwischen Philippinen und Celebes)."

Type Series. — "4 Typen in Meiner Sammlung."

Lectotype. — One of the above, USNM 60603.

taunayi, Xylechinus

Eggers, 1928b: 84.

Type Locality. — "Brazil, São Paulo (Campos do Jordão)."

Type Series. — "Typen in Museu Paulista und Sammlung Eggers."

Lectotype. — One of the above Eggers Types, USNM 59243.

tauricus, Eccoptogaster

Eggers, 1914: 185.

Type Locality.—“Krim (Sebastopol).”

Type Series.—“Typen in Sammlung Pliginski und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female, USNM 60586 (the specimen has been dissected by Wichmann).

testudo, Xyleborus

Eggers, 1939a: 116.

Type Locality.—“Formosa (Trichu ...).”

Type Series.—“Typen und Cotypen in coll. M Chujo, coll. Eggers und im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem.”

Lectotype.—One of the above Types, a female, USNM 60690.

tolimanus, Xyleborus

Eggers, 1928b: 97.

Type Locality.—“Columbia [sic!] (Tolima).”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers ... drei Stück dieses Käfers ...”

Lectotype.—One of the above Types, a female, USNM 60765.

tonsus, Hypothenemus

Eggers, 1919 [1920]: 242.

Type Locality.—“Amani (Ostafrika).”

Type Series.—“2 Stück in Sammlung Hagedorn und Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers specimens, a female (not a male), USNM 60174.

transbaicalicus, Hylurgops

Eggers, 1941b: 119.

Type Locality.—“Wladiwostok.”

Type Series.—“Wladiwostok am Pinus korejensis, ded. Prof. Stark. Type; und einige andere Fundorte in Ostsibirien; Japan (Tomakomai), leg. 4.V.1910 Niisima, Type und Cotypen in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above Type, USNM 59128.

triarmatus, Eccoptogaster

Eggers, 1912c: 205.

Type Locality.—“Patria dubiosa, verisimile Gallia mer.”

Type Series.—“Ich muss diesen Käfer nach einem Einzelstück, dass ich ohne Vaterlandsangabe einer Sendung französischer Ipiden von Desbrochers des Loges entnahm, beschreiben.”

Holotype.—The above, a female, USNM 60587.

tridentatus, Ips

Eggers, 1921: 41.

Type Locality.—“Makri, im Lycischen Taurus, Kleinasien.”

Type Series.—No comment on the number of specimens nor location of types.

Lectotype.—A male, USNM 60268.

trispinosus, Scolytodes

Eggers, 1934b: 80.

Type Locality.—“Mexico (Amatan).”

Type Series.—“Type in Sammlung Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60403.

triton, Xyleborus

Schaufuss, 1905: 18.

Type Locality.—“Madagaskar.”

Type Series.—No comment on the distribution of the types.

Lectotype.—A female from the Schaufuss collection bearing Schaufuss' and Eggers' Type labels, USNM 60708.

tuberculatus, Corthylus

Eggers, 1940b: 140.

Type Locality.—“Guadeloupe (Coubeyre).”

Type Series.—“Typen ♂ ♀ in coll. Eggers.”

Lectotype.—One of the above male Types, USNM 60388.

tuberculatus, Dryotomus

Eggers, 1943a: 348.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, USNM 60891.

tuberculatus, Hylurgops

Eggers, 1933c: 98.

Type Locality.—“Tatsienlu Tjiji, Szechuan, China.”

Type Series.—“Type und cotype in meiner Sammlung.”

Holotype.—The above Type, evidently a female, USNM 59129.

tuberculatus, Ips

Eggers, 1927a: 79.

Type Locality.—“Philippinen: Mindoro, Mangarin.”

Type Series.—“Typen in Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above, the upper of two on the same pin, a male, USNM 29112.

tuberculatus, Phloeotribus

Eggers, 1949–50 [1951]: 147.

Type Locality.—“Costa Rica (Turrialba).”

Type Series.—“Type und Cotype in coll. Eggers.”

Holotype.—The above Type, USNM 69631.

tuberculifer, Brachyspartus

Eggers, 1937: 86.

Type Locality.—“Brasilien (Bahia).”

Type Series.—“Typen (Männchen und Weibchen) im Britischen Museum. Cotypen (Männchen und Weibchen) in meiner Sammlung.”

Lectotype.—One of the above male Cotypes, USNM 60590.

tupolevi, Leperisinus

Eggers, 1942a: 28.

Type Locality.—“Turkestan.”

Type Series.—“2 von Stark benannte Exemplare in meiner Sammlung.”

Lectotype.—One of the above, USNM 59219.

uniseriatus, Phloeotribus

Eggers, 1943a: 350.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type und Cotypen in coll. Eggers, 1 Cotype im Museum Paris.”

Lectotype.—One of the above Eggers cotypes, the upper of two on the same pin, a female, USNM 60868.

uniseriatus, Stephanoderes

Eggers, 1924: 103.

Type Locality.—“Congostaat (Luebo ... und Banana ...).”

Type Series.—“Congostaat (Luebo im Museum Tervueren und Sammlung Eggers und Banana in Sammlung Eggers.).”

Lectotype.—One of the specimens from Luebo, Congo, bearing Eggers' Type label, a female, USNM 60169.

uniseriatus, Thamnurgides

Eggers, 1936b: 85.

Type Locality.—“Java ... Preanger.”

Type Series.—“Java, Type von Preanger in meiner Sammlung, Cotype von Buitenzorg in Sammlung Kalshoven.”

Holotype.—The above Type, USNM 60203.

ursa, Xyleborus

Eggers, 1923b: 172.

Type Locality.—“Neu Guinea (Sudost.), Paumotufluss, Moroka, Haveri”

Type Series.—“Typen im Museo Civico Genova und Sammlung Eggers.”

Lectotype.—One of the above Eggers Types, a female from Haveri, New Guinea, USNM 60711.

uyttenboogaarti, Dactylotrypes

Eggers, 1927d: 28.

Type Locality.—“Gran Canaria.”

Type Series.—No comment regarding types.

Lectotype.—A female from the Eggers collection bearing Eggers' Type label, USNM 60595.

vestitus, Loganius

Eggers, 1929a: 59.

Type Locality.—“Ostbolivia” (the specimen bears the label Cochabamba, Bolivia).

Type Series.—“4 Stücke in coll. Eggers.”

Lectotype.—One of the above, a male, USNM 60395.

vestitus, Phloeotribus

Eggers, 1943a: 349.

Type Locality.—“Bolivia (Cochabamba).”

Type Series.—“Type in coll. Eggers.”

Holotype.—The above, a female, USNM 60869.

vestitus, Problechilus

Eggers, 1932d: 233.

Type locality.—“Bolivien (Cochabamba).”

Type series.—“Type und Cotype in coll. Eggers.”

Holotype.—The above Type, USNM 60238.

volastos, Thamnophthorus

Schedl, 1938: 175.

Type Locality. — "Bolivien, Cochabamba."

Type Series. — "Type in Sammlung Eggers, Cotype in Sammlung Schedl."

Holotype. — The above Type, labeled *Conophthorus volastos* in Schedl's handwriting, USNM 60666.

zeae, Pagiocerus

Eggers, 1928b: 92.

Type Locality. — South America.

Type Series. — "Bogota, 1 Stück in Sammlung Eichhoff, als *P. rimosus* von Eichhoff bezettelt; Guadeloupe, aus Sammlung Schaufuss II. und, von Dr. Zacher mir zur Bestimmung geschickt, in südamerikanischen Maiskörnern nach Deutschland eingeschleppt, ohne sichere genaue Herkunft, in Sammlung Eggers."

Lectotype. — One of the above, from South American corn kernels, without definite locality, USNM 60312.

Literature Cited

Eggers, H.

- 1908a. Ein neuer Borkenkäfer aus Sibirien. *Wiener Entomologische Zeitung*, 27:144.
- 1908b. Drei neue Scolytiden aus Sicilien. *Il Naturalista Siciliano*, 20:121-123.
- 1908c. Zwei neue Scolytiden aus Italien. *Il Naturalista Siciliano*, 20:193-194.
- 1908d. Fünf neue Borkenkäfer. *Entomologische Blätter*, 4:214-217.
- 1910a. Vier weitere paläarktische Borkenkäfer. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1910, pages 557-561.
- 1910b. Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer. *Entomologische Blätter*, 6:35-39.
- 1911a. Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer. *Entomologische Blätter*, 7:73-76.
- 1911b. Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer. *Entomologische Blätter*, 7:119-123.
- 1912a. Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer. II. *Entomologische Blätter*, 8:47-49.
- 1912b. Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer. III. *Entomologische Blätter*, 8:113-117.
- 1912c. Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer. IV. *Entomologische Blätter*, 8:203-210.
- 1914. Bemerkungen zu Reitters Borkenkäferbestimmungstabellen, 2. Auflage. *Entomologische Blätter*, 10:107-110 and 183-189.
- 1915. *Ips fallax* nov. spec. *Entomologische Blätter*, 11:96-97.

- 1919. 60 neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika, nebst zehn neuen Gattungen, zwei Abarten. *Entomologische Blätter*, 15:229-243 (published in 1920).
- 1920. 60 neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika, nebst zehn neuen Gattungen [continued]. *Entomologische Blätter*, 16:33-45 and 115-126.
- 1921. Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer. II. *Entomologische Blätter*, 17:39-43.
- 1922a. Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer. III. *Entomologische Blätter*, 18:12-18.
- 1922b. Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer. IV. *Entomologische Blätter*, 18:116-121.
- 1922c. Neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika (Nachtrag I). *Entomologische Blätter*, 18:163-174.
- 1923a. Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer. V. *Entomologische Blätter*, 19:133-139.
- 1923b. Neue Indomalayische Borkenkäfer (Ipidae). *Zoologische Mededeelingen*, 7:129-220.
- 1924. Neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika (Nachtrag II). *Entomologische Blätter*, 20:99-111.
- 1925. Ipidae aus Birma. *Sborník Entomologického Oddělení Národního Muzea v Praze*, 3:151-160.
- 1926. Japanische Borkenkäfer. I. *Entomologische Blätter*, 22:133-138, 145-148.
- 1927a. Neue Indo-Malayische Borkenkäfer (Ipidae). II. Nachtrag. *The Philippine Journal of Science*, 33:67-108.
- 1927b. Neue Indomalayische Borkenkäfer (Ipidae). I. Nachtrag. *Treubia*, 9:390-408.
- 1927c. Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer VI. *Entomologische Blätter*, 23:120-123.
- 1927d. Zwei neue Borkenkäfer (Ipidae) von den Canarischen Inseln. *Tijdschrift voor Entomologie*, 70:37-40.
- 1927e. Neue Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Afrika (Nachtrag III). *Revue Zoologique Africaine*, 15:172-199.
- 1928a. Ein neuer Coccotrypes (Ipidae, Col.). *Tijdschrift voor Entomologie*, 71:117-118.
- 1928b. Ipidae (Coleoptera) da America do Sul. *Archivos do Instituto Biologico de Defesa Agricola e Animal*, 1:83-99.
- 1929a. Zehn neue *Loganius*-Arten (Ipidae, Col.) aus Südamerika. *Wiener Entomologische Zeitung*, 46:59-65.
- 1929b. Zwei neue *Blastophagus*-Arten (Ipidae, Col.). *Entomologische Blätter*, 25:103-104.
- 1929c. Fünf neue Borkenkäfer aus dem Osten. *Entomologische Nachrichtenblatt*, 3:9-11.
- 1930a. Neue *Xyleborus*-Arten (Col. Scolytidae) aus Indien. *Indian Forest Records*, 14:177-208.
- 1930b. Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. III. *Entomologische Blätter*, 26:163-171.
- 1931a. Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. III. (Schluss.) *Entomologische Blätter*, 27:14-23.
- 1931b. Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. IV. *Wiener Entomologische Zeitung*, 48:29-42.
- 1932a. Neue Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Africa (Nachtrag IV). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, 22:23-37.

- 1932b. Neue Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Africa (Nachtrag V). (Schluss.) *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, 22:291-304.
- 1932c. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna II. *Entomologische Meddelelser*, 18:80-83.
- 1932d. Borkenkäfer (Ipidae Col.) aus Südamerika. V. Die Gattung *Problechilus* Eichh. mit 8 neuen Arten. *Wiener Entomologische Zeitung*, 49:226-235.
- 1933a. Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika, VI Material des Muséum Paris aus Franz. Guayana und Venezuela. *Travaux du Laboratoire d'Entomologie. Muséum National d'Histoire Naturelle. Mémoires originaux*. Number 1, 37 pages.
- 1933b. Ein neuer *Scolytus* aus Ungarn. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna III. *Entomologisches Nachrichtenblatt*, 7:75-76.
- 1933c. Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus China. *Entomologisches Nachrichtenblatt*, 7:98-102.
- 1933d. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. I. *Entomologische Blätter*, 29:1-10.
- 1933e. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. *Entomologische Blätter*, 29:49-56.
- 1933f. Neue Borkenkäfer (Col., Scolytidae) aus Africa (Nachtrag V). *Stylops*, 2:16-24.
- 1934a. Zur Synonymie der Borkenkäfer (Ipidae, Col.). *Entomologisches Nachrichtenblatt*, 8:23-29.
- 1934b. Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. VII. *Entomologische Blätter*, 30:78-84.
- 1935a. Fünf neue Arten der Gattung *Scolytotrupis* (Col. Ipidae) aus dem indomalayischen Gebiet. *Entomologische Blätter*, 31:240-245.
- 1935b. Neue Borkenkäfer (Ipidae Col.) aus Afrika. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, 27:295-311.
- 1935c. Borkenkäfer aus Südamerika (Ipidae, Col.) VII. Vergessene und neue Gattungen (1. Teil). *Revista de Entomologia (Rio de Janeiro)*, 5:75-87.
- 1935d. Borkenkäfer aus Südamerika (Ipidae, Col.) (Fortsetzung) VII. Vergessene und neue Gattungen (1. Teil). *Revista de Entomologia (Rio de Janeiro)*, 5:153-159.
- 1935e. Borkenkäfer aus Südamerika (Ipidae, Col.) (Schluss) VII. Vergessene und neue Gattungen (1. Teil). *Revista de Entomologia (Rio de Janeiro)*, 5:329-334.
- 1936a. Neue Borkenkäfer (Scolytidae, Col.) aus Indien. *Annals and Magazine of Natural History*, series 10, 17:626-636.
- 1936b. Neue indomalayische Borkenkäfer (Ipidae) III. Nachtrag. *Tijdschrift voor Entomologie*, 79:77-91.
- 1936c. Borkenkäfer aus Südamerika (Ipidae, Col.) VIII. Vergessene und neue Gattungen (2. Teil). *Revista de Entomologia (Rio de Janeiro)*, 6:388-394.
1937. Borkenkäfer aus Südamerika (Ipidae, Col.) VIII. Vergessene und neue Gattungen (2. Teil, Schluss). *Revista de Entomologia (Rio de Janeiro)*, 7:79-88.
- 1939a. Japanische Borkenkäfer II. *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, 6:114-123.
- 1939b. Die Africanische Gattung *Xyloctonus* Eichh. (Col. Ipidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, 32:14-18.
- 1940a. Neue Borkenkäfer (Col., Scolytidae) aus Afrika Nachtrag IX. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, 33:99-108.
- 1940b. Borkenkäfer aus Südamerika. (Coleoptera: Ipidae). IX. Insel Guadeloupe. *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, 7:123-141.
- 1940c. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. VII. Fünf neue Arten aus Anatolien. *Centralblatt für das gesamte Forstwesen*, 66:36-39.
- 1940d. Neue indomalayische Borkenkäfer (Ipidae) III. Nachtrag (Fortsetzung). *Tijdschrift voor Entomologie*, 83:132-154.
- 1941a. Borkenkäfer aus Südamerika. (Coleoptera: Ipidae). IX. Insel Guadeloupe. (Schluss). *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, 8:99-109.
- 1941b. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. VI. *Stettiner Entomologische Zeitung*, 102:119-124.
- 1942a. Zur Paläarktischen Borkenkäferfauna. (Coleoptera: Ipidae). VIII. Borkenkäfer aus dem asiatischen Russland. *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, 9:27-36.
- 1942b. Neue Arten und Bestimmungstabelle der Gattung *Phloeoborus*. (Coleoptera: Ipidae). *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, 9:266-274.
- 1943a. Borkenkäfer (Col., Ipidae) aus Südamerika. X. Bolivia. *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft e. V.*, 33:344-389.
- 1943b. Neue Borkenkäfer aus dem Deutschen Entomologischen Institut. (Coleoptera: Ipidae). *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, 10:241-248.
- 1944a. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna (Coleoptera, Ipidae) X. *Entomologische Blätter*, 40:140-143.
- 1944b. Neue Borkenkäfer (Col. Scolytidae) aus Africa. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, 38:92-98.
- 1949-50. Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. XII. *Entomologische Blätter*, 45-46:144-154. (Published April 1, 1951.)
- Eichhoff, W.
1868. Neue americanische Borkenkäfer-Gattungen und Arten. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 12:145-152.
- Hagedorn, M.
1904. Steinussbohrer. *Allgemeine Zeitschrift für Entomologie*, 9:447-452.
1910. Diagnosen bisher unbeschriebener Borkenkäfer (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1910:1-13.
- Schaufuss II, C.
1891. Beitrag zur Käferfauna Madagascars. II. *Tijdschrift voor Entomologie*, 34:1-36.
1897a. Borkenkäfer-Studien. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 42:101-112.
1897b. Beitrag zur Käferfauna Madagascars. III. *Tijdschrift voor Entomologie*, 40:209-225.

1905. Borkenkäferstudien. II. *Insekten-Börse*, 22:18-19.
Schedl, K. E.
1936. Scolytidae and Platypodidae: Fauna Philippinensis, IV. *Philippine Journal of Science*, 60:59-67.
1938. Die Einteilung der Pityophthorinae. *Archiv für Naturgeschichte*, N. F., 7:157-188.
1943. Fauna Philippinensis VII. *Entomologische Blätter*, 39:34-41.
1949. Forstrat Hans Eggers †. *Zentralblatt für das Gesamtgebiet der Entomologie*, 3:1-2.

Publication in Smithsonian Contributions to Zoology

Manuscripts for serial publications are accepted by the Smithsonian Institution Press subject to substantive review, only through departments of the various Smithsonian museums. Non-Smithsonian authors should address inquiries to the appropriate department. If submission is invited, the following format requirements of the Press should govern the preparation of copy.

Copy must be typewritten, double-spaced, on one side of standard white bond paper, with 1½" top and left margins, submitted in ribbon copy with a carbon or duplicate, and accompanied by the original artwork. Duplicate copies of all material, including illustrations, should be retained by the author. There may be several paragraphs to a page, but each page should begin with a new paragraph. Number all pages consecutively, including title page, abstract, text, literature cited, legends, and tables. A manuscript should consist of at least thirty pages, including typescript and illustrations.

The *title* should be complete and clear for easy indexing by abstracting services. Taxonomic titles will carry a final line indicating the higher categories to which the taxon is referable: "(Ammonoides: Goniatitidae)." Include an *abstract* as an introductory part of the text. Identify the *author* on the first page of text with an unnumbered footnote that includes his professional mailing address. A *table of contents* is optional. An *index*, if required, may be supplied by the author when he returns page proof.

Two *headings* are used: (1) text heads (boldface in print) for major sections and chapters and (2) paragraph sideheads (caps and small caps in print) for subdivisions. Further headings may be worked out with the editor.

In *taxonomic keys*, number only the first item of each couplet; if there is only one couplet, omit the number. For easy reference, number also the taxa and their corresponding headings throughout the text; do not incorporate page references in the key.

In *synonymy*, use the short form (taxon, author, date, page) with a full reference at the end of the paper under "Literature Cited." Begin each taxon at the left margin with subsequent lines indented about three spaces. Within a taxon, use a period-dash (.—) to separate each entry. Enclose with square brackets any annotation in or at the end of the taxon. For *synonymy* and *references within the text*, use the author-date system: "(Jones 1910)." Use the colon system for page references: "(Jones 1910:122)," and abbreviate further data: "(Jones 1910:122, fig. 3, pl. 5: fig. 1)."

Simple *tabulations* in the text (e.g., columns of data) may carry headings or not, but they should not contain rules. Formal *tables* must be submitted as pages separate from the text, and each table, no matter how large, should be pasted up as a single sheet of copy.

Use the *metric system* instead of (or in addition to) the English system.

Illustrations (line drawings, maps, photographs, shaded drawings) usually can be intermixed throughout the printed text. They will be termed *Figures* and should be numbered consecutively; however, if a group of figures is treated as a single figure, the individual components should be indicated by lowercase italic letters on the illustration, in the legend, and in text references: "Figure 9*b*." Submit all legends on pages separate from the text and not attached to the artwork. An instruction sheet for the preparation of illustrations is available from the Press on request.

In the *bibliography* (usually called "Literature Cited"), spell out book, journal, and article titles, using initial caps with all words except minor terms such as "and, of, the." (For capitalization of titles in foreign languages, follow the national practice of each language.) Under-score (for italics) book and journal titles. Use the colon-parentheses system for volume number and page citations: "10(2):5-9." Spell out such words as "figures," "plates," "pages."

For *free copies* of his own paper, a Smithsonian author should indicate his requirements on "Form 36" (submitted to the Press with the manuscript). A non-Smithsonian author will receive fifty free copies; order forms for quantities above this amount, with instructions for payment, will be supplied when page proof is forwarded.

